

GØDSKNING AF VINTERRAPS OM EFTERÅRET

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevarerministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Det er vigtigt at sikre rapsens næringsstofbehov fra efteråret. Den store nedbørsmængde i sommerperioden i år kan udløse ekstra behov for kvælstof og kalium på grovsandet jord.

- [Kvælstofbehov](#)
- [Andre næringsstoffer](#)
- [Mikronæringsstoffer](#)
- [Udbringningsmetode](#)
- [Gylle](#)
- [Udbringningsstrategi](#)
- [Reglerne for forsuring og slangeudlægning før såning](#)

I forbindelse med såning af vinterraps har mange marker om efteråret behov for at få tilført kvælstof og evt. kalium. Mængden bør afpasses efter dyrkningshistorie og forfrugt, og om der nedmuldes halm.

Vinterraps har en betydelig optagelse af næringsstoffer om efteråret. Optagelsen afhænger i høj grad af såtidspunktet og af vejret fra såning til vinterens komme. En veludviklet vinterraps kan optage 80-100 kg kvælstof pr. ha i løbet af efteråret og stort set den samme mængde kalium.

Næringsstofforsyningen fra gødskning og jorden skal sikre, at vinterrapsen opnår et

tilstrækkeligt udviklingstrin inden vinteren. Nedenfor gennemgås vinterrapsens behov for forskellige typer af næringsstoffer i løbet af efteråret.

KVÆLSTOFBEHOV

Kvælstof om efteråret er vigtigt for at sikre et passende udviklingstrin inden vinteren. På husdyrbrug er der ved tidlig såning oftest tilstrækkeligt med tilgængeligt kvælstof i jorden i efteråret til, at der ikke opnås merudbytter for tildeling, når forårstilførslen korrigeres herefter. Selvom der ikke er kvælstofbehov, kan det alligevel anbefales at tildele en mindre kvælstofmængde for at styrke rapsens konkurrenceevne overfor ukrudt.

Ved sen såning er N-tilførsel vigtig for at få en hurtig vækststart. Vær opmærksom på ikke at give for meget kvælstof ved sen såning, da afgrøden ikke kan nå at udnytte det. Vinterrapsens kvælstofoptagelse falder drastisk, jo senere der sås.

I tabel 1 herunder er givet et forslag til tildeling af kvælstof til vinterraps om efteråret.

Tabel 1. Forslag til tildeling af kvælstof til vinterraps om efteråret.

| Jordtype | Husdyrgødning i tidligere år | Forfrugt | Kvælstofbehov, kg N/ha | |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Sået før 20/8 | Sået efter 20/8 |
| JB 4 og derover | Ingen eller beskeden tilførsel | Frøgræs eller halmnedmuldning | 60 | 40 |
| | | Anden forfrugt | 40 | 30 |
| | Regelmæssig tilførsel af husdyrgødning | Frøgræs, eller halmnedmuldning | 30 | 40 |
| | | Anden forfrugt | 20 | 30 |
| JB 1-3 | Ingen eller beskeden tilførsel | Frøgræs eller halmnedmuldning | 50 | 40 |
| | | Anden forfrugt | 30 | 30 |
| | Regelmæssig tilførsel af husdyrgødning | Frøgræs eller halmnedmuldning | 40 | 40 |
| | | Anden forfrugt | 30 | 40 |

ANDRE NÆRINGSSTOFFER

Ved lave kaliumtal, hvilket næsten altid er tilfældet på grovsandet jord, skal rapsen tilføres 30-50 kg kalium pr. ha om efteråret samtidig med kvælstoftildelingen. Netop i 2015 er det ekstra vigtigt på grund af den meget store sommernedbør. Hvis der hyppigt nedmuldes halm eller anvendes fast husdyrgødning eller dybstrøelse, dækkes kaliumbehovet almindeligvis herfra undtagen på grovsandet jord.

Ved lave fosfortal og/eller høje reaktionstal bør der ligeledes suppleres med fosfor.

Da der også er behov for magnesium, bør der ved lave magnesiumtal anvendes en magnesiumholdig gødning. Hvis der skal tildeles kvælstof i handelsgødning, skal tilførslen ske med en svovlholdig kvælstofgødning. Hvis der mangler fosfor og kalium, kan en NPK-gødning anvendes.

MIKRONÆRINGSSTOFFER

Generelt tyder ingen forsøgsresultater på, at vinterraps har brug for tilførsel af mikronæringsstoffer om efteråret. Det gælder hverken mangan, bor, magnesium eller molybdæn.

UDBRINGNINGSMETODE

Hvis man råder over placeringsudstyr til gødning på såmaskinen, anbefales det at placere gødningen ved såning. Placeret gødning har den fordel, at det er rapsen, som gødskes frem for ukrudt.

GYLLE

Vinterraps kan udnytte gylle om efteråret, uden at det medfører et større tab af kvælstof ved udvaskning. Generelt kan gylle tilføres i en mængde svarende til den mængde ammoniumkvælstof, der angives i kvælstofmængderne i tabel 1. Normalt er der ikke behov for at tilføre mere end 15-20 ton slagtesvinegylle - svarende til 40-60 kg ammoniumkvælstof pr. ha. På grovsandet jord med meget lave kaliumtal kan der være behov for at supplere med 30 kg kalium i handelsgødning.

UDBRINGNINGSTRATEGI

Fordele og ulemper ved forskellige udbringningstidspunkter for gylle til vinterraps fremgår af nedenstående tabel. Ved sensåning eller tidlig vinter er N-udnyttelsen op til 15 pct. større ved udbringning før såning, sammenlignet med udbringning efter såning i efteråret. Ved udbringning af gylle før såning sikres det endvidere, at den planlagte mængde gylle udbringes inden 1. oktober, hvis vejrforholdene skulle blive ugunstige for gyllevognen i september. Ved manglende opbevaringskapacitet er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at der skal være plads i gyllebeholderen frem til ca. 1. april for at kunne være sikker på ikke at få kapacitetsproblemer til foråret.

Tabel 2. Fordele og ulemper ved forskellige udbringningsteknikker og –tidspunkter i vinterraps.

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | Nedfældning før såning | Forsuret gylle nedharvet før såning | Udbringning af gylle fra rapsens fire-bladsstadiet (september) |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

| | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fordele: | God kvælstofvirkning Hurtig vækststart Gøder ikke ukrudtet | God kvælstofvirkning Sikrer vinterrapsens svovlforsyning | Sikrer kapacitet af gyllebeholder til foråret ofte billigst i udbringning |
| Ulemper | Struktur – og såbedskader specielt på lerjord og bakket jord | Skal anmeldes til kommunen. Krav om ekstra forsuret vintersædsareal | Risiko for dårligere N-udnyttelse Manglende udvikling af rapsafgrøde Dårligt vejr |

Ved nedfældning af gylle før såning nedfældes gyllen i stubben, som herefter pløjes. Jo større kvælstofmængde, der udbringes pr. ha, jo vigtigere er det at så tidligt, for at rapsen kan optage kvælstofmængden. Stor gyllemængde og høje temperaturer kan give en kraftig vækst, som kan udløse behov for vækstregulering af rapsen inden vinteren.

REGLERNE FOR FORSURING OG SLANGEUDLÆGNING FØR SÅNING

Betingelserne for at anvende slangeudlægning af gylle før såning er, at den er forsuret, og at der slangeudlægges gylle på et vintersædsareal på 20 pct. af det areal, hvor der udbringes forsuret gylle til inden såning. Det betyder, at for hver 10 ha vinterraps, hvor der forsures og slangeudlægges gylle inden såning, skal der udbringes forsuret gylle til 2 ha med vintersæd (faktor 0,2 = 20 pct.).

Inden udbringning af forsuret gylle før såning skal der indsendes en skriftlig meddelelse til kommunalbestyrelsen om, hvilke arealer der er omfattet i den pågældende planperiode, samt hvilken forsuringsteknik der anvendes.

Krav til pH ved forsuring ved udbringning på sort jord er:

Tabel 3. Oversigt over krav til pH ved udbringning af forsuret gylle før såning.

| | Kvæggylle, krav til pH, mindre end eller lig med | Andre typer |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Staldforsuring | 5,5 | 5,5 |
| Tankforsuring | 6,0 | 6,0 |
| Kyndetofte Markforsuring | 6,0 | 6,0 |
| Syre-N (Biocover) Markforsuring | 6,4 | 6,0 |

Reglerne om anvendelse af forsuret gylle før såning fremgår af:

[husdyrgødningsbekendtgørelsen § 28, stk. 5.](#)

Og [teknologilisten](#).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

© 2021 - SEGES Projektsitet