

NYT OM SKADEGØRERE FRA REGISTRERINGSNETTET I MAJS OG ROER I UGE 34

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Beslutning om evt. svampebekæmpelse i majs skal træffes senest i denne uge i mange marker. I meget sent udviklede marker er bekæmpelse mindre aktuel. Der er behov for meldugbekæmpelse i flere sukkerroemarker.

Bladsvampe i majs. Der registreres hver uge angreb af bladsvampe i majs i 27 marker, hvor 18 marker er pløjet og 9 marker er upløjet. Alle marker har forfrugt majs.

Majsøjeplet har bredt sig i den forløbne uge og er mest udbredt. Mest øjeplet er fundet i de upløjede marker. Majsøjeplet trives under kølige (ca. 15-22 °C) og fugtige forhold, mens majsbladplet trives bedst ved lidt højere temperaturer (ca. 20-28 °C) og bladfugt.

Der er fundet majsøjeplet i alle de upløjede marker og i ca. 50 procent af de pløjede marker.

Der er på de 2 blade under kolben fundet op til 25 procent dækning af majsøjeplet i upløjet og op til 3 procent dækning i pløjet. Der er på de to blade over kolben fundet op til 5 procent dækning af majsøjeplet i upløjet og op til 1 procent dækning i pløjet.

For at vurdere angrebene af majsøjeplet er det vigtigt at holde bladene op mod lyset, fordi

bladpletterne herved bliver mere tydelige. Se billede 1.

Bekæmpelse anbefales ved over 5-10 procent planter med angreb på bladene omkring kolberne. Hvis der kun er angreb på de nederste blade, udløser dette ikke bekæmpelse.

Evt. bekæmpelse anbefales fra omkring stadium 51 (hanblomsterstand mærkbar) til sprøjtefristen i stadium 65 (fuld blomstring). Til bekæmpelse kan anvendes 0,7 l Opera pr. ha.

Der er stor spredning på markernes udvikling. De længst udviklede marker er i st. 69 (blomstring afsluttet), mens det gennemsnitlige udviklingstrin er omkring stadium 65 (fuld blomstring). Beslutning om evt. bekæmpelse skal derfor træffes senest i denne uge i mange marker.

I meget sent udviklede marker er bekæmpelse mindre aktuel.

Fra nu af bedømmes kun hver anden uge. Næste bedømmelse udføres derfor først den 31/8-1/9.

Bladsvampe i sukkerroer. NBR Nordic Beet Research, Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Nordic Sugar A/S Agricenter bedømmer hver uge angreb af bladsvampe. Der er begyndende angreb af meldug flere steder og angrebene er i moderat stigning, så der er udløst bekæmpelse i flere marker.

Se uddybende kommentarer herunder.

- [Bladsvampe i majs.](#)
- [Bladsvampe i sukkerroer.](#)



Billede 1. For at se de tidligste angreb af majsøjeplet skal bladene holdes op imod lyset.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

