

3. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 37

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Bekæmpelsestærsklen for larveangreb er pt. overskredet på ca. 10 procent af lokaliteterne.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 75 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers *larver*.

Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg.

Det fremgår af fangsterne, at aktiviteten af rapsjordlopper har været lav i den forløbne uge, hvilket sikkert skyldes det regnfulde og kølige vejr.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt.

Bekæmpelsestidspunktet rettet mod larver er i et vist omfang fleksibelt og anbefales ved overskridelse af tærsklen først fra omkring 5 løvbladstadiet for ikke at få for kort virkningstid (kontaktmidler).

Ses på fangsterne fra de sidste 2 uger, er bekæmpelsestærsklen pt. kun overskredet på ca. 10 procent af lokaliteterne.


I figur 1 nedenfor kan udviklingen i år sammenlignes med tidligere år. Af de viste år var de

kraftigste angreb i efteråret 2008, hvor der var kraftige angreb i mange marker.

Bekæmpelse rettet mod de *voksne rapsjordloppers* bladgnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse rettet mod bladgnav skal man derfor se sig til. Bekæmpelse af bladgnav anbefales frem til, at ca. fire løvblade er udviklet, hvis der er over ti procent bortgnavet bladareal.

Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i marker, hvor der er anvendt ubejdset udsæd, eller hvor der kun er bejdset med Force. Mesurol har også kortere virkningstid end Cruiser RAPS/Modesto FS 480.

Se [data og uddybende kommentarer](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2015. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.