

2. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE OG VINTERBYG I UGE 40

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Der er fundet op til 5 procent angrebne planter i vinterbyg og op til 2 procent angrebne planter i vinterhvede. Angrebene ligger pt. under niveauet i efteråret 2014 og også under niveauet i efteråret 2011

Forekomsten af bladlus følges ugentlig i registreringsnettet i 33 vinterhvede- og 23 vinterbygmarker i dette efterår frem til og med 2.-3. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.


Der er fundet flest bladlus i vinterbyg, hvor der i gennemsnit er 0,7 procent angrebne planter og op til 5 procent angrebne planter. I hvede er der fundet i gennemsnit 0,4 procent angrebne planter og op til 2 procent angrebne planter. Angrebsstyrken kan sammenholdes med registreringsnettet i tidligere år. Se figur 1-2 nedenfor. Det fremgår, at angrebene pt. er svagere end på samme tidspunkt i efteråret 2014, hvor de hidtil kraftigste angreb optrådte. Angrebene er

pt. også svagere end i efteråret 2011.


Der findes ingen vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus i vintersæd om efteråret, fordi klimaforholdene resten af efteråret ikke kendes og antallet af bladlus med virusmitte er ukendt. Bekæmpelse skønnes i tidligt såede marker dog nødvendig, hvis der er anslået omkring 2-3 procent angrebne planter.


Evt. bekæmpelse anbefales tidligst udført fra omkring 3-4 bladstadiet. En engelsk temperaturmodel anbefaler ved bladlusangreb bekæmpelse ved 170 graddage med basis 3 grader. Opsummering af graddage sker fra fremspiring, og graddageberegneren findes på Landbrugsinfo.dk under "Vejret". Ved fremspiring medio september vurderes bekæmpelse afhængig af lokalitet aktuel fra omkring første uge af oktober.

Se data og yderligere kommentarer i [vinterbyg](#) og [vinterhvede](#).



Figur 1. Udviklingen af bladlus i registreringsnettet i vinterbyg i efterårene 2008-2015.





Figur 2. Udviklingen af bladlus i registreringsnettet i vinterhvede i efterårene 2008-2015.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.