

5. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 39

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Bekæmpelsestærsklen for larveangreb er pt. overskredet på godt 20 procent af lokaliteterne.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 75 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens *larver*.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden.

Bekæmpelsestidspunktet rettet mod larver er i et vist omfang fleksibelt og anbefales ved overskridelse af tærsklen fra omkring 5 løvbladstadiet for ikke at få for kort virkningstid (kontaktmidler). Ses på fangsterne fra de sidste 3 uger, er bekæmpelsestærsklen pt. overskredet med godt 20 procent af lokaliteterne.


I figur 1 nedenfor kan udviklingen i år sammenlignes med tidligere år. Af de viste år var de kraftigste angreb i efteråret 2008, hvor der var kraftige angreb i mange marker.

Der lægges flest æg i varmt vejr. En analyse af temperaturforholdene i dette efterår viser, at der i de tidligt såede marker (1. halvdel af august) har været "normale" temperaturforhold for æglægning. I de senere såede marker (2. halvdel af august) har det hidtil været noget køligere end normalt, hvorfor æglægningen har været under "normal" .

Bekæmpelse rettet mod de *voksne* rapsjordloppers bladgnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse rettet mod bladgnav skal man derfor se sig til. Bekæmpelse af bladgnav anbefales frem til, at ca. fire løvblade er udviklet, hvis der er over ti procent bortnavet bladareal.

Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i marker, hvor der er anvendt ubejdet udsæd, eller hvor der kun er bejdet med Force. Mesurol har også kortere virkningstid end Cruiser RAPS/Modesto FS 480.

Se [data og uddybende kommentarer](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2015. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.