

NYT OM SKADEGØRERE FRA REGISTRERINGSNETTET I MAJS OG ROER I UGE 36

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Sprøjtefristen i majs er nu overskredet, men udviklingen af bladsvampe følges fortsat. Angreb af majsøjeplet og majsbladplet har bredt sig. Der er behov for meldugbekæmpelse i flere sukkerroemarker.

Bladsvampe i majs. Der registreres angreb af bladsvampe i majs i 27 marker, hvor 18 marker er pløjet og 9 marker er upløjet. Alle marker har forfrugt majs.

Svampebekæmpelse er ikke længere aktuel da majsens gennemsnitlige udviklingstrin er omkring stadium 69 (blomstring afsluttet). De længst udviklede marker er i st. 73 (kernernes indhold vandtæt/let mælket).

Udviklingen i bladsvampe følges fortsat for at indhente mere viden om bladsvampenes udvikling under forskellige dyrkningsforhold, herunder klima og dyrkningsteknik.

Majsbladplet og majsøjeplet har bredt sig i den forløbne uge. Majsøjeplet er mest udbredt. Majsøjeplet trives under kølige (ca. 15-22 °C) og fugtige forhold, mens majsbladplet trives bedst ved lidt højere temperaturer (ca. 20-28 °C) og bladfugt.

Der er fundet majsøjeplet i alle de upløjede marker og i ca. 65 procent af de pløjede marker.

Der er på de 2 blade *under* kolben fundet op til 30 procent dækning af majsøjeplet i upløjet og op til 10 procent dækning i pløjet. Der er på de to blade *over* kolben fundet op til 8 procent dækning af majsøjeplet i upløjet og op til 1 procent dækning i pløjet.

Der er fundet majsbladplet i ca. 60 procent af de upløjede marker og i ca. 65 procent af de pløjede marker.

Der er på de 2 blade *under* kolben fundet op til 40 procent dækning af majsbladplet i upløjet og op til 20 procent dækning i pløjet. Der er på de to blade *over* kolben fundet op til 3 procent dækning af majsbladplet i upløjet og op til 2 procent dækning i pløjet.

For at vurdere angrebene af majsøjeplet er det vigtigt at holde bladene op mod lyset, fordi bladpletterne herved bliver mere tydelige. Se billede 1.

Der bedømmes kun hver anden uge. Næste bedømmelse udføres den 14/9-15/9.

Bladsvampe i sukkerroer. NBR Nordic Beet Research, Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Nordic Sugar A/S Agricenter bedømmer hver uge angreb af bladsvampe. Der er angreb af meldug flere steder og angrebene er i moderat stigning, så der er udløst bekæmpelse i mange marker. I nogle marker er der nu behov for en anden behandling.

Se uddybende kommentarer herunder

Bladsvampe i majs.

Bladsvampe i sukkerroer.



Billede 1. For at se de tidligste angreb af majsøjeplet skal bladene holdes op imod lyset.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.

