

NYT OM SKADEGØRERE I REGISTRERINGSNETTET I VINTERSÆD, VÅRSÆD, FRØGRÆS OG MAJS I UGE 27

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Svampebekæmpelse i hvede skal nu afsluttes. Bygrust breder sig i vårbyg. Der er meget få bladlus.

Vinterhvede. *Gulrust:* Mest findes i Substance og JB Asano, hvor der er udløst gulrustbekæmpelse i ca. 85 hhv. 80 procent af de ubehandlede marker. I mange af markerne er der 100 procent angrebne planter, og der ses også angreb i akset. 3. mest gulrust er fundet i Jensen, hvor der er udløst bekæmpelse i ca. 50 procent af de ubehandlede marker.

I følgende sorter er der også fundet gulrust: Hereford, KWS Cleveland (8 marker), KWS Dacanto, Nakskov, Torp (7 marker) og Elixer (6 marker). Mindst er fundet i Mariboss, hvor der fortsat kun fundet angreb på 1 lokalitet (0,5 procent angrebne planter), og angrebet har ikke udviklet sig.

I vårhvede er der også meldt om gulrustangreb i flere tilfælde.

Brunrust: angreb er fundet i 5 marker.

Septoria: angrebene har igen bredt sig i den forløbne uge som følge af tidligere nedbør. Mest

Septoria er fundet i Hereford, KWS Dacanto og KWS Cleveland.

Det gennemsnitlige vækststadiet er 69 (afblomstret), mens variationen er st. 61-73. Evt. svampebekæmpelse skal nu til at afsluttes.

Hvis sidste sprøjtning udføres med en passende dosering fra begyndende skridning (st. 52-53) eller senere, er der i pløjede marker oftest ikke behov for yderligere behandling mod Septoria.

I de meget gulrustmodtagelige sorter Substance og JB Asano kan bekæmpelse til vækststadium 71 (kerneindhold vandagtigt, de første kerner har halv størrelse) dog være nødvendig.

Bladlus: angrebene er svage. Der er kun fundet bladlus på knap 15 procent af lokaliteterne med op til 5 procent angrebne strå.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i hvede i år.

Vårbyg. Både bygrust, skoldplet og bygbladplet har bredt sig i den forløbne uge, og bygrust har bredt sig mest.

Bygrust er fundet i alle sorter, men mindst i Evergreen. I flere sorter er der denne uge udløst bygrustbekæmpelse i ca. 25 procent af de ubehandlede marker. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter til st. 65 (blomstring).

Bygbladplet er fundet i alle sorter og mest i Quench, Laurikka og Propino, hvor der denne uge er udløst bekæmpelse af bygbladplet i ca. 10-20 procent af de ubehandlede marker.

Bygbladplet bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter i st. 30-50 og ved over 25 procent angrebne planter i st. 51-65.

Skoldplet er også fundet med mere udbredte angreb i de fleste sorter. Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter og mindst 5 dage med nedbør (over 1 mm og indenfor 14 dage).

Vær især opmærksom på evt. angreb af skoldplet og eller bygbladplet i marker med forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning.

I Propino er der denne uge udløst meldugbekæmpelse i ca. 20 procent af de ubehandlede marker. Meldug bekæmpes kun indtil gennemskridning og ved over 50 procent angrebne planter.

Evt. bekæmpelse af øvrige svampesygdomme i vårbyg er aktuel til omkring blomstring (vækststadium 65).

Der er stor spredning på vårbygmarkernes udvikling, og smittetrykket øges ved meget sen såning. Det gennemsnitlige vækststadiet er 57 (tæt på fuld gennemskridning), mens de længst udviklede marker er afblomstrede.

Ved behandling omkring skridning kan f.eks. anvendes Proline eller Prosaro tilsat Comet/Comet Pro eller Aproach, hvor Comet/Comet Pro kun må benyttes 1 gang pr. sæson i byg. På det sene tidspunkt anbefales 25-40 procent dosis afhængig af smittetryk og evt. forudgående behandling.

Angrebene af skadedyr er meget svage. Der er fundet bladlus på ca. 15 procent af lokaliteterne og med op til 5 procent angrebne strå.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i vårbyg i år.

Havre. Meldug har bredt sig lidt i den forløbne uge. Meldug bekæmpes i st. 37-50 ved over 50 pct. angrebne planter og i st. 51-65 ved over 75 pct. angrebne planter.

Angrebene af havrebladplet er svage. Der er fundet angreb af havrepletbakteriose i flere marker. Der er stor variation på markernes udvikling. Det gennemsnitlige vækststadium er 55 (under skridning).

Angrebene af skadedyr er svage. Der er fundet op til 2 procent angrebne strå.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i havre i år.

Alm. rajgræs. De fleste marker er nu i fuld blomstring, og de tidligste sorter er afblomstrede. Evt. bekæmpelse af kronrust anbefales indtil afblomstring og skal derfor nu til at afsluttes. Til bekæmpelse af kronrust kan anvendes omkring 0,45 l Bell eller 0,3 l Bell + 0,1 l Comet/0,15 l Comet Pro.

Fremover skal der derfor kun holdes øje med evt. angreb af sortrust. Der er pt. ikke fundet sortrust.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i rajgræs i år. Hvis der dog findes sortrust efter denne uge, ønskes dette også indberettet.

Hvedegalmyg. Vinterhvede er nu ikke længere modtagelig, men vær opmærksom på evt. angreb i vårhvede. Hvede er modtagelig fra omkring vækststadium 41-61 (lige før begyndende skridning til begyndende blomstring). Flest hvedegalmyg ses i marker og områder med megen hvededyrkning. Bekæmpelse anbefales ved fangst af 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag, såfremt hveden samtidig er i vækststadium 41-61. Ved fangst af over 30 hvedegalmyg pr. dag er der også en risiko, men det er usikkert, om bekæmpelse er rentabel.

Den høje tærskel har i år kun været overskredet på 2 lokaliteter (Nordborg og Fuglebjerg), mens den lave tærskel nu begynder at blive overskredet på lidt flere lokaliteter. Galmyggene flyver i tørt, varmt og vindstille vejr.

Majshalvmøl. Der er denne uge fanget et enkelt majshalvmøl på 2 lokaliteter på Bornholm og 1 lokalitet på Falster. Tidligere i år er der på 2 lokaliteter i Sønderjylland fanget et enkelt majshalvmøl. Fundene er verificeret


Følg også bedømmelserne i korn i observationsparcellerne på følgende link:

<http://pdsorter.pdir.dk>


Nedenfor ses link til registreringerne og uddybende kommentarer til de enkelte afgrøder.

- [Vinterhvede](#)
- [Vårbyg](#)
- [Havre](#)

- Alm. rajgræs
- Hvedegalmyg
- Majshalvmøl



Figur 1. Udviklingen af Septoria i 2015 og de to foregående år, procent angrebne planter. Udviklingen kan kun vurderes fra omkring uge 21. Dette skyldes, at der før er bedømt angreb på hele planten, ligesom der er færre registreringer. De seneste uger er der derimod bedømt procent planter med angreb på et af de 3 øverste fuldt udviklede blade.





Figur 2. Udviklingen af bygrust i vårbyg i 2015 og de to foregående år, procent angrebne planter.



Billede 1. Bygrust breder sig i mange vårbygssorter.



Billede 2. Havrepletbakteriose. De hvide småaks skyldes ikke havrepletbakteriose. Der er ingen muligheder for kemisk bekæmpelse. Foto: Carsten Kløcher, Djursland Landboforening.



Billede 3. Majshalvmøl på limplade i feromonfælde.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.