

NYT OM SKADEGØRERE I REGISTRERINGSNETTET I VINTERSÆD, VÅRSÆD, FRØGRÆS OG MAJS I UGE 28

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Svampebekæmpelse i korn er nu ikke længere aktuel bortset fra i usædvanlig sent udviklede vårsædsmarker. Bladlusene har bredt sig i det varme vejr, men der er stadig relativ få bladlus.

Hvede. Evt. svampebekæmpelse er aktuel til og med stadie 71 (de første kerner halv størrelse) og er derfor nu ikke længere aktuel. Det gennemsnitlige vækststadie er st. 72 (tæt på tidlig mælkeodent stadie), mens de længst udviklede marker er i stadie 75 (kerneindhold mælket og let grynnet, alle kerner fuld størrelse).

Der er fortsat meget gulrust i ubehandlede marker med Substance og JB Asano også i akset. I de øvrige sorter er også fundet tilfælde af angreb, mens der i Mariboss i år kun er fundet angreb i en enkelt mark, hvor angrebet ikke har udviklet sig.

Brunrusten har udviklet sig lidt i den sidste uges varme vejr, og mest ses i Hereford og Torp. Brunrust bekæmpes til og med st.71 (de første kerner har nået halv størrelse) ved over 25 procent angrebne planter og er således kun undtagelsesvis aktuel i meget sent udviklede marker.

Septoria breder sig fortsat i mange marker og mest ses i Hereford, KWS Cleveland og Nakskov. Angrebsstyrken ligger i år under angrebsstyrken i 2014, men over niveauet i 2013. Se figur 2 nedenfor.

Vårbyg. Evt. svampebekæmpelse er aktuel til omkring blomstring (st. 65) og er derfor ikke længere aktuel i de fleste marker. Det gennemsnitlige vækststadium er st. 67 (tæt på afblomstring), mens de længst udviklede marker er i st. 75 (kerneindhold mælket og let grynet, alle kerner fuld størrelse).

I usædvanlig sent udviklede marker kan bekæmpelse stadig være aktuel. Vær især opmærksom på evt. sene angreb af bygrost, der igen har bredt sig i den forløbne uge.

Havre. Evt. svampebekæmpelse er aktuel til omkring blomstring (st. 65) og er derfor ikke længere aktuel i de fleste marker. Det gennemsnitlige vækststadium er st. 69 (afblomstret), mens de længst udviklede marker er i st. 75 (kerneindhold mælket og let grynet, alle kerner fuld størrelse).

I usædvanlig sent udviklede marker kan bekæmpelse stadig være aktuel. Meldug bekæmpes i st. 51-65 ved over 75 pct. angrebne planter.

Der er fundet angreb af havrepletbakteriose i flere marker. Bakteriesygdommen kan ikke bekæmpes med svampemidler.

Skadedyr i hvede, vårbyg og havre. Bladlusene har bredt sig i den sidste uges varme vejr, men angrebene er fortsat relativt svage, og der er kun fundet op til 10 procent angrebne strå i både hvede, vårbyg og havre. Bladlus bekæmpes til vækststadium 73 (tidlig mælkemodent stadium) ved 40 procent angrebne strå, hvis der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse. Bekæmpelse af bladlus kan være aktuel til og med vækststadium 75 og anbefales ved 100 procent angrebne strå i st. 74-75 (kerneindhold mælket og let grynet, alle kerner fuld størrelse). Afgrødens "grønhed" og midlernes sprøjtefrister (21-42 dage afhængig af middel) skal også tages med i betragtning ved sen bekæmpelse

Der skal nu ikke foretages flere registreringer i hvede, vårbyg og havre. Vi takker for indberetningerne.

Alm. rajgræs. Der skal nu kun holdes øje med evt. angreb af sortrust, som bekæmpes indtil ca. 3 uger før høst. Der er pt. endnu ikke fundet sortrust.

Dette var sidste registrering i rajgræs i år. Hvis der fremover findes sortrust, ønskes dette også indberettet. Vi takker for indberetningerne.


Majshalvmøl. Der er udstationeret feromonfælder til at følge forekomsten af majshalvmøl i 26 majsmarker. Der er denne uge fundet fra 1 til 4 majshalvmøl på 4 lokaliteter nemlig på 3 lokaliteter på Lolland-Falster og 1 lokalitet ved Løgumkloster. Tidligere er der også fundet et enkelt majshalvmøl på 2 lokaliteter på Bornholm og på 1 lokalitet mere i Sønderjylland.

Følg også bedømmelserne i korn i observationsparcellerne på følgende link:

<http://pdsorter.pdir.dk>


Nedenfor ses link til registreringerne og uddybende kommentarer til de enkelte afgrøder.

- [Vinterhvede](#)
- [Vårbyg](#)
- [Havre](#)
- [Alm. rajgræs](#)
- [Majshalvmøl](#)




Figur 1. Udviklingen af bygrust i vårbyg i 2015 og de to foregående år, procent angrebne planter.





Figur 2. Procent dækning af Septoria på 2. øverste blad i hvede.



Billede 1. Brunrust på faneblad fotograferet 7. juli. Foto: Mads Brandt, LandbrugsRådgivningSyd.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.