



FLERE BRUGER KØNSSORTERET SÆD TIL KVIERNE

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Ca. halvdelen af de danske kvægbesætninger bruger nu systematisk kønssorteret sæd til kvierne. Især Jersey er storforbrugere.

Forbruget af kønssorteret sæd (KSS) til kvierne er steget markant de seneste par år. Fra 2013 – 2016 steg forbruget således med op til 13,5 procentpoint afhængig af race – mindst for RDM og størst for Jersey. Jerseybesætninger er altså de flittigste brugere. I 2016 blev der anvendt KSS på næsten en tredjedel af Jerseykvierne – nemlig knap 27 pct. For Holsteinkvierne blev der brugt KSS til ca. 23 pct., mens det gjaldt for ca. 20 pct. af RDM-kvierne.

FLERE BRUGER KSS SOM EN SYSTEMATISK STRATEGI

Der er flere årsager til stigningen i forbruget. En af årsagerne er formentligt kvotestoppet i april 2015, som på mange bedrifter har medført et ønske om flere køer i besætningen. En anden årsag kan være et ønske om at fintune økonomien i besætningen ved at producere kvier på de

avlsmæssigt bedste hundyr og dermed opnå et højere avlsmæssigt niveau i besætningen. En sådan strategi skal kombineres med brug af kødkvægssæd, da der sjældent er økonomi i at producere ekstra kvier til salg.

Endelig skyldes stigningen, at flere besætninger er begyndt at bruge KSS som en systematisk strategi – dvs. at de bruger minimum 10 pct. KSS. For RDM og Holstein steg andelen af besætninger, der brugte KSS systematisk fra 2013 til 2016 med ca. 16 procentpoint, mens den steg med 30 procentpoint hos Jersey. Det betyder, at to tredjedel af Jerseybesætningerne nu systematisk bruger KSS på deres kvier. Omkring 40-65 % (afhængig af race) af alle danske besætninger anvender KSS systematisk, og sammen står de for ca. 90 pct. af forbruget af kønssorteret sæd. De resterende 10 pct. bruges sporadisk.

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 10 – 2016