



Mødereferat

| | |
|------------|---|
| Mødedato | 25-05-2016 |
| Sted | PRA kontor |
| Cc | [Navn] |
| Deltagere | Benny Kirkeby, Preben Østergaard, Peter Raundal |
| Fraværende | [Navn] |

Opfølgning på DAKA undersøgelsen, april

Handlingsansvarlig

Håndtering af tilbageløb på korrekt aflivning

Der har været 4 tilbageløb på seneste DAKA.-undersøgelse for korrekt aflivning.

Fire ejere i alt har ringet om følgende:

- En kalv der angives som aflivet af slagter og hvor halssnittet er lagt på langs i halsvenen
- En kalv. Der er skudt med haglgevær, hvilket iflg. Ejer er OK med FVST (vi finder det lidt underligt, idet kun kalve med et skudhul i panden indgår i undersøgelsen)
- En ko, hvor ejer angiver at den er aflivet med jagtriffel og efterfølgende afblødt. Opfordrer desuden til fotodokumentation
- En ko, hvor dyrlæge har skudt og afblødt ved snit på langs af halsvenen

Proceduren på DAKA er, at der undersøges for eventuel afblødning efter at dyret er "pustet" op af DAKA personalet. Når dyret ligger til afhudning indstikkes sonde med trykluft ind under huden ved brystindgangen. Herefter indblæses trykluft så hud skilles fra det underliggende væv, hvilket gør afhudningen meget nemmere. Når et dyr således er pustet op er det meget nemt at se om det er afblødt eller ej. Desuden står der 2-4 slagtere (DAKA personale), der er meget

erfarne og kan bidrage til vurdering af om dyret er afblødt eller ej.

BKI og PROE er derfor ret sikre på at deres vurdering af "ikke afblødt" er korrekt.

Følgende aflivningsmetoder kan være vanskelige at vurdere:

- Hvis skudt med jagtriffel i panden: Indgangshul bør da være af mindre kaliber (max 6-7 mm) end ved bolt pistol (kaliber 9 mm). PRA undersøger muligheden for at fremstille engangsprober med diameter på knap 9 mm. Fx afsavede stykker af en rundstok. Såfremt proben kan penetrere indgangshul vurderes dyret af være skudt med bolt pistol.
- Rygmarvsstøder: *PRA undersøger reglerne herfor - -det er umuligt at vurdere om der er anvendt rygmarvsstøder*

Følgende aftal på mødet:

- Der skal tages billeder ved alle tilfælde om "ikke korrekt aflivning". Et billede visende indgangshul, med isat probe, samt CJKR nr. Et billede visende underside af hals (manglende afblødning)
- PRA kontakter Rene Vernersen om det er OK at tage disse fotos.
- PRA sender link til BKI+PROE med mappedestination for arkivering af billeder
- PRA undersøger muligheden for fremstilling af engangsprober
- BKI sender kontaktoplysninger på "Lars" på DAKA. Han står for landmandskontakten og har modtaget en del henvendelser efter seneste stikprøve i april
- PRA justerer ordlyden i brevet til landmænd (fx "vi har vurderet at..." samt påfører navn og tlfnr som kontaktperson ved spørgsmål