

BEST PRACTICE SMITTEBESKYTTELSE



Begræns
smittespredning ved
indgivelse af medicin
i yveret.

Se også video

FOTO FRA SEGES VIDEOFILM OM KVÆGBRUG.

LandbrugsInfo.dk > Kvæg > Film > Smittebeskyttelse

2. INDGIVELSE AF MEDICIN I YVERET

1. Medicinen indgives på det udmalkede yver lige efter malkning. Brug altid handsker for at holde den bedst mulige håndhygiejne.
2. Indret gerne en særlig værktøjskasse med to rum, hvor det ene rum kan betragtes som beskidt, det andet som rent.
3. Røde bånd sættes på bagbenene – før man behandler – så man ikke glemmer det. Det er også en god idé ved brug af patteforsegling.
4. Aftørring foregår med papirvådservietter eller ren klud. Brug enten ny serviet/klud eller et hjørne ad gangen pr. patte. Rækkefølge **med uret: venstre for, højre for, højre bag, venstre bag**.
5. Der prædyppes i rækkefølge **med uret og start med venstre for**. Lad pattedyppet virke i mindst 30 sekunder. Aftørring af patter og pattespidser med papirvådservietter skal også ske i rækkefølge **med uret og start med venstre for**. Brug en ny serviet pr. kirtel.
6. Spritservietterne, som følger med sprøjten, bruges til at desinficere pattespidserne i rækkefølge **med uret og start med venstre for**. Brug en ny serviet pr. kirtel.
7. Indgivelse af medicinen foretages i modsat rækkefølge af desinfektionen dvs. **mod uret og start med venstre bag**.
8. Efter medicinindgivelsen påføres pattedypp i rækkefølge **med uret og start ved venstre for**.



Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen

LDP 2020



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Side 1/2

BEST PRACTICE

SMITTEBESKYTTELSE

Pkt. Supplerende kommentarer

1. Når man behandler med medicin i yveret eller forsegler patten, er hygiejnen vigtig. Hvis man ikke er omhyggelig, risikerer man, at der kommer bakterier i yveret.

'Værktøjskassen' skal indeholde:

1. Antal nødvendige markeringsbånd
2. Papirservietter
3. Handsker
4. Nødvendige antal tuber
5. Spritservietter til alle kirtler
6. Prædyp skum
7. Pattedyp.

3. Når man behandler yveret med antibiotika, skal der røde markeringer på begge ben.

4. Efter at patterne er tjekkede og desinficerede kan medicinen sprøjtes op. Brug tuber med beskyttelseskrave. Aftørring skal foregå fra forreste del af yveret for at reducere risikoen for kontakt med patter, som allerede er aftørrede.

5. Tjek, at prædyp er af et godkendt præparat.

6. Der følger spritservietter med medicinsprøjten til afspritning af pattespidser inden indgivelse af medicinen.

8. Efter behandlingen skal koen stå fikseret under opsyn i 30 minutter, mens pattekanalerne lukker sig. Koen skal i perioden have adgang til frisk vand og foder.