

REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 37

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 15 procent af markerne. Der lægges væsentlig flere æg i varme efterår.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 85 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver.

Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring.

Pt. er tærsklen overskredet i ca. 15 procent af markerne. I figuren nedenfor kan udviklingen i år sammenlignes med tidligere år.

Rapsjordlopperne ligger væsentlig flere æg i varme efterår som i år end i køligere efterår. Bekæmpelsestærsklen i fangbakkerne er derfor nok lidt lavere i år, men en nøjagtig tærskel kan ikke angives.

Bekæmpelsestidspunktet rettet mod larver er i et vist omfang fleksibelt og kan udføres fra

omkring 5 løvbladstadiet og indtil medio til ultimo oktober. Senere bekæmpelse kan også give væsentlig effekt, men er svingende og tilstræbes ikke.


I figur 1 ses udviklingen i dette efterår i forhold til tidligere efterår.

Bekæmpelse rettet mod de voksne rapsjordloppers bladgnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse rettet mod bladgnav skal man derfor se sig til. Bekæmpelse af bladgnav anbefales frem til at ca. 4 løvblade er udviklet, hvis der er over 10 procent bortgravet bladareal.

Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i marker, hvor der er anvendt ubejdset udsæd. Sorterne Alabama, Architect og Archimedes er ubejdset mod skadedyr.

Sneglegrav ses også i år. Huller efter rapsjordlopper er oftest små runde huller inde på bladpladen, mens snegle laver mere uregelmæssige gnav og oftest i bladrandene. Hold også øje med evt. angreb af de grønne kålmøllarver.

Se [data og uddybende kommentarer](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2016. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.