

NYT OM SKADEGØRERE I REGISTRERINGSNETTET I MAJS OG ROER, UGE 28

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se '[EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne](#)'

Majsøjeplet trives godt i det fugtige vejr.

Bladsvampe i majs: Udviklingen af majsøjeplet, majsbladplet og majsrust følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 17 pløjede marker og 8 upløjede marker. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb er højest i de upløjede marker, fordi smitstof af bladpletsvampe overlever på planterester af majs.

Der bedømmes i starten procent angrebne planter, men efterhånden som det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent dækning på de 2 blade over og under kolben samt på bladet, der støtter kolben. Endelig bedømmes procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. Dette skyldes, at den vejledende bekæmpelsestærskel i pløjede marker er over 10 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. I upløjede marker med forfrugt majs anbefales svampebekæmpelse generelt, fordi risikoen for angreb her er meget høj.

I de *upløjede marker* er der fundet angreb af majsøjeplet i ca. 30 procent af markerne (op til 80 procent angrebne planter), og der er fundet angreb af majsbladplet i ca. 10 procent af markerne (op til 10 procent angrebne planter).

I de *pløjede marker* er der fundet angreb af majsøjeplet i ca. 30 procent af markerne (op til 60 procent angrebne planter), og der er fundet angreb af majsbladplet i ca. 5 procent af markerne (op til 2 procent angrebne planter).

Fra praksis er der også i flere tilfælde meldt om angreb af majsøjeplet på de nedre blade i både upløjede og pløjede marker.

Der er ikke fundet angreb af majsrust.

Der er stor spredning på markernes udviklingstrin. Det gennemsnitlige vækststadie er 36, mens de længst udviklede marker er i vækststadium 55 (hanblomst halvt fremme).

Den vejledende bekæmpelsestærskel i pløjede marker på over 10 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben, er pt. ikke overskredet i registreringsnettet.

Det nuværende fugtige vejr fremmer majsøjeplet, så følg udviklingen meget nøje.

Majshalvmøl: der er fundet majshalvmøl i flere landsdele både i Vestjylland, Sønderjylland, Ærø, Sjælland, Møn og Bornholm.

Bladsvampe i sukkerroer: de første indberetninger af bladsvampe i sukkerroer starter torsdag i denne uge.

Se data og yderligere kommentarer på linkene nedenfor.

- [Bladsvampe majs](#)
- [Majshalvmøl](#)
- [Bladsvampe i sukkerroer](#)

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.