

## 3. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE OG VINTERBYG I UGE 40

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:  
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevarerministeriet  
NaturErhvervstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond  
for udvikling af Landdistrikterne

**LDP 2020**



Se '[EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne](#)'

Der er fortsat mange bladlus i flere tidligt såede marker. Bekæmpelse er aktuel fra 3-4 udviklede blade. Gentagen behandling kan være aktuel ved mange bladlus.

Forekomsten af bladlus følges ugentlig i registreringsnettet i 32 vinterhvede- og 22 vinterbygmarker i dette efterår frem til og med 7.-8. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

Det usædvanlig varme vejr i september har givet gode betingelser for bladlus. Det er derfor meget vigtigt i år at undersøge markerne for evt. angreb af bladlus.

I vinterbyg er der fundet bladlus i ca. 90 procent af de ubehandlede marker og med 50 hhv. 20 procent angrebne planter som de kraftigste angreb. I gennemsnit er der 8 procent angrebne planter.

I vinterhvede er der fundet bladlus i ca. 85 procent af de ubehandlede marker og med 80 hhv. 20 procent angrebne planter som de kraftigste angreb. I gennemsnit er der 7 procent angrebne

planter.

I figur 1-2 nedenfor er angrebene i år sammenlignet med tidligere år.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Bekæmpelse udføres, når der er udviklet 3-4 blade. En temperaturmodel på Landbrugsinfo under "Vejret" kan også benyttes til at vurdere bekæmpelsestidspunktet (indtast dato for fremspiring, 170 graddage, basis 3 grader og 0,7 grader i temperaturstigning).


Ved fortsat mange bladlus i marken gentages behandlingen efter ca. 2 uger.


Lettere nattefrost får ikke bladlusene til at forsvinde. Forsøg har vist, at halvdelen af havrebladlusene dør ved  $\div 0,5^{\circ}\text{C}$  og halvdelen af kornbladlusene først dør ved  $\div 8^{\circ}\text{C}$ .

Typisk indeholder i størrelsesordenen 1- 2 procent af de indflyvende bladlus havrerødsotvirus. Viruset overføres ikke til afkommet. Bladlusene skal først suge 2-3 dage på angrebne planter for at optage viruset. I starten vil mange bladlus derfor suge på ikke angrebne planter.


Til bekæmpelse anbefales ca. 50-75 procent dosis, dvs. 0,125 - 0,15 l/ha Fastac, 0,1 - 0,15 kg/ha Karate 2,5 WG, 0,05 – 0,075 kg Kaiso Sorbie, 0,1 - 0,15 l/ha Cyperb 100/100W, 0,025 - 0,04 l Cythrin 500, 0,025 - 0,04 l Nexide CS eller 0,05 - 0,1 l/ha Mavrik (0,15 - 0,2 er normaldosering). I vinterbyg kan yderligere anvendes 0,1- 0,15 l Biscaya, da midlet har fået en såkaldt "mindre anvendelse" i denne afgrøde.

Se data og yderligere kommentarer i [vinterhvede](#) og [vinterbyg](#)





Figur 1. Udviklingen af bladlus i vinterbyg i registreringsnettet i efterårene 2009-2016.



Figur 2. Udviklingen af bladlus i vinterhvede i registreringsnettet i efterårene 2009-2016.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

---

© 2021 - SEGES Projektsitet