

REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 38

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se '[EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne](#)'

Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 20 procent af markerne. Der lægges væsentlig flere æg i varme efterår.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 90 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring.

Pt. er tærsklen overskredet i ca. 20 procent af markerne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at rapsjordlopperne ligger væsentlig flere æg i varme efterår som i år end i køligere efterår. Bekæmpelsestærsklen i fangbakkerne er derfor noget lavere i år, men en nøjagtig tærskel kan ikke angives.


Bekæmpelsestidspunktet rettet mod larver er i et vist omfang fleksibelt og kan udføres fra omkring 5 løvbladstadiet og indtil medio til ultimo oktober. Senere bekæmpelse kan også give væsentlig effekt, men er svingende og tilstræbes ikke.

Pyrethroiderne Karate (0,2 kg pr. hektar), Kaiso Sorbie (0,1 kg pr. hektar), Mavrik (0,2 l pr. ha) Nexide CS (0,06 liter pr. ha), Cythrin 500 (0,04 l pr. ha) og Cyperb 100/100 W (0,2 liter pr. ha) er godkendt til bekæmpelse af rapsjordlopper. Efter de nye afgifter er kun Karate, Kaiso Sorbie og Mavrik i handelen. Der er kun få erfaringer med nedsatte doser.

I figur 1 ses udviklingen i dette efterår i forhold til tidligere efterår.

Bekæmpelse rettet mod de voksne rapsjordloppers bladgnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse rettet mod bladgnav skal man derfor se sig til. Bekæmpelse af bladgnav anbefales frem til at ca. 4 løvblade er udviklet, hvis der er over 10 procent bortgnavet bladareal.

Se [data og uddybende kommentarer](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2016. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.