

NYT OM SKADEGØRERE I MAJS I UGE 28

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Der er fundet majsøjeplet i nogle marker. Evt. bekæmpelse er normalt tidligst aktuel fra vækststadium 51 (hanblomsten mærkbar men ikke synlig)

MAJSSVAMPE

Forekomsten af majsøjeplet, majsbladplet og majsrust følges fra 3. juli i 24 marker med majshelsød i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Alle marker har forfrugt majs. Der bedømmes i 16 pløjede og 8 upløjede marker. Risikoen for angreb er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi smitstof af svampe overlever på planteresterne.

Anden registrering er foretaget, og der er fundet majsøjeplet i 3 pløjede marker (10-80 procent angrebne planter) og 2 upløjede marker (1-90 procent angrebne planter). Majsbladplet er kun fundet i en enkelt upløjet mark (1 procent angrebne planter).

Fra praksis er i helt enkelte tilfælde meldt om mere udbredte angreb af majsøjeplet i nogle upløjede marker med forfrugt majs.

Pt. vurderes der ikke at være bekæmpelsesbehov. Evt. bekæmpelse udføres normalt i perioden vækststadium 51 (hanblomster mærkbare, men ikke synlige) og indtil sprøjtefristen, som er fuld blomstring for Opera og Comet Pro (vækststadium 65) og afsluttet blomstring (vækststadium

69) for Propulse. Ved bekæmpelsesbehov er én behandling normalt tilstrækkelig.

I pløjede marker anbefales bekæmpelse ved over 35 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben. Denne bedømmelse udføres, når det kan anes, hvor kolben dannes. I upløjede marker med forfrugt majs anbefales generelt en bekæmpelse i perioden vækststadium 51 til blomstring, fordi risikoen for angreb her er meget høj.


Ved meget tidlige og kraftige angreb kan to behandlinger med nedsat dosis undtagelsesvis være nødvendig. Der findes ingen tærskel for, hvornår der er behov for to behandlinger, men hvis der er mange blade med meget majsøjeplet på de fleste af planterne før vækststadium 51 anbefales en tidligere og en delt behandling med 2-3 ugers mellemrum.

MAJSHALVMØL


Der har indtil videre været fanget 1 eller flere majshalvmøl på 13 af de 21 lokaliteter.

Se registreringerne på nedenstående links.

- [Bladsvampe i majs](#)
- [Majshalvmøl](#)



Billede 1. Begyndende angreb af majsøjeplet fotograferet i denne uge. Når bladene holdes op mod lyset, bliver de runde brune pletter med en gul zone omkring meget tydelige. Der kan findes enkelte pletter af majsøjeplet på nogle af planterne i mange majsmarker. Derfor findes der en tærskel for angreb, som udløser en sprøjtning.





Billede 2. Han af majshalvmøl fanget i feromonfælde fotograferet af Per Jensen, VKST. Farvestyrken kan godt variere lidt, men aftegningerne er karakteristiske for majshalvmøl.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.