

FØRSTE REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 35

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

De første registreringer er udført. Pt. er det ikke aktuelt at udføre bekæmpelse rettet mod laver.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 70 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver.

Første registrering er udført, og der er flere steder fundet rapsjordlopper i fangbakkerne. Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet. Pt. er det ikke aktuelt at udføre bekæmpelse rettet mod larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordlopper i fremspiringsfasen. Bladgnav bekæmpes ved over 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at der er udviklet ca. 4 løvblade. Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i sorter, der ikke er bejdset mod skadedyr, dvs. i sorterne Alabama, Alasco, Angelico, Archimedes og Architect.

Se [data og uddybende kommentarer](#).





Billede 1. De tidligste gnav fra de voksne rapsjordlopper ligner "skudhuller".
Fotograferet 28. august 2017 i rapsmark bejdsat med Cruiser RAPS af Gitte Skovgaard Jensen,

LMO.



Billede 2. Gnav efter snegle på rapsspildplanter. Snegleangreb sker fra randen af bladene.
Vær også opmærksom på evt. snegleangreb i rapsmarkerne.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.