

## 2. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER UGE 36

### Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet  
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond  
for Udvikling af Landdistrikterne

**LDP 2020**



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Der er endnu relativ få rapsjordlopper i de fleste marker. Hold især øje med bladgnav i marker med ubejdsset udsæd.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 70 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordlopper i fremspiringsfasen. Bladgnav bekæmpes ved over 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at der er udviklet ca. 4 løvblade. Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i sorter, der ikke er bejdsset mod skadedyr, dvs. i sorterne Alabama, Alasco, Angelico, Archimedes og Architect.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet.

Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring.

Hvis der optælles fra indeværende uge 36, er tærsklen på de 25 rapsjordløpper pt. kun overskredet på en enkelt lokalitet (Glenstrup ved Mariager).

Se [data og uddybende kommentarer](#).

**Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.**