

3. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER I UGE 37

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Hold især øje med bladnav i marker med ubejdset udsæd. Der er stadig få rapsjordløpper i fangbakkerne de fleste steder.

Forekomsten af rapsjordløpper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 75 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordløppens larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordløpper i fremspiringsfasen. Bladnav bekæmpes ved over 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at der er udviklet ca. 4 løvblade. Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i sorter, der ikke er bejdset mod skadedyr, dvs. i sorterne Alabama, Alasco, Angelico, Archimedes og Architect.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet.


Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i varme efterår lægges der mange æg.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordløpper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring.

Hvis der optælles fra den foregående uge 36, har tærsklen på de 25 rapsjordlopper pt. kun været overskredet på to lokaliteter (Glenstrup ved Mariager og Otterup på Fyn). Se udviklingen i år i forhold til de foregående år i figur 1.

To konsulenter har meddelt, at de finder mange gnav af rapsjordlopper i nogle marker, men ingen eller kun få rapsjordlopper i fangbakkerne i de samme marker. Hvis der er mange gnav af rapsjordlopper, anbefales bekæmpelse rettet mod larver dog også. Det vides ikke, om det ustadige vejr er årsag til en mindre "springaktivitet" af rapsjordlopper.

Se [data og uddybende kommentarer](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2017. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.