

4. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER I UGE 38

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Der er stadig få rapsjordlopper i fangbakkerne de fleste steder. Er der mange gnav, anbefales det også at udføre bekæmpelse rettet mod larver.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 75 lokaliteter. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordlopper i fremspiringsfasen. Bladgnav bekæmpes ved over 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at der er udviklet ca. 4 løvblade. Vær især opmærksom på evt. tidlige angreb i sorter, der ikke er bejdset mod skadedyr, dvs. i sorterne Alabama, Alasco, Angelico, Archimedes og Architect.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet.

Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken, og især i tørre og varme efterår lægges der mange æg.

Den vejledende bekæmpelsestærskel er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring.

Tre konsulenter har meddelt, at de finder mange gnav af rapsjordlopper i nogle marker, men ingen eller kun få rapsjordlopper i fangbakkerne i de samme marker. Hvis der er mange gnav af rapsjordlopper, anbefales bekæmpelse rettet mod larver dog også. Det vides ikke, om det ustadige vejr er årsag til en mindre "springaktivitet" af rapsjordlopper.

A photograph showing a white plastic container, possibly a bucket or a large jug, floating in a body of water. The container has a yellow cap. A long, thin white pole is attached to the container and extends vertically into the air. The background consists of a grassy bank or shoreline.

Fangster af rapsjordlopper efterår 2008-2017

Uge nr.	Series 1 (Dark Teal)	Series 2 (Yellow)	Series 3 (Blue Dashed)	Series 4 (Green Dashed)	Series 5 (Red Dotted)
35	20	5	10	5	0
36	65	10	25	10	0
37	115	20	35	15	5
38	170	35	45	20	10
39	205	45	55	25	15
40	230	50	65	30	20
41	235	55	70	35	25
42	240	55	75	35	25
43	242	58	78	35	25
44	243	60	80	35	25
45	243	60	80	35	25



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2017. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.