

8. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER I UGE 42

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Tærsklen på de 25 rapsjordlopper har indtil videre været overskredet på knap 25 procent af lokaliteterne. I flere marker er der set meget bladgnav. Her anbefales en bekæmpelse rettet mod larver også.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker i planteavlskonsulenternes registreringsnet på ca. 75 lokaliteter. Denne uge er der ikke modtaget så mange indberetninger. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordlopper i fremspiringsfasen. Bladgnav bekæmpes ved over 10 procent bortgnavet bladareal frem til, at der er udviklet ca. 4 løvblade.

Grundet den langsomme vækst i år har mange marker været følsomme for bladgnav i en længere periode, og i flere marker er der set kraftige bladgnav. Hvor der er mere udbredte bladgnav, anbefales også en bekæmpelse rettet mod larver.

Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet.


Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Tærsklen på de 25 rapsjordlopper har indtil videre været overskredet på knap 25 procent af lokaliteterne. Se udviklingen i år i forhold til de foregående år i figur 1.

Til bekæmpelse af larver anbefales 0,2 kg Karate eller 0,1 kg Kaiso Sorbie pr. ha. Der er kun få erfaringer med nedsatte doser. Mavrik er også godkendt til formålet, men har i de sidste to års landsforsøg haft lavere effekt end Kaiso Sorbie, som Mavrik har været sammenlignet med. Kaiso Sorbie og Karate indeholder samme aktivstof. I landsforsøgene har der været god effekt mod larver i hele oktober måned. I november kan i mildt vejr også opnås væsentlig effekt, men bekæmpelse i oktober foretrækkes.

Flere har i år meddelt, at de finder mange gnav af rapsjordlopper i nogle marker, men ingen eller kun få rapsjordlopper i fangbakkerne i de samme marker. Hvis der er mange gnav af rapsjordlopper, anbefales bekæmpelse rettet mod larver dog også. Det vides ikke, om det ustadige vejr har været årsag til en mindre "springaktivitet" af rapsjordlopper.

Se [data og uddybende kommentarer](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2017. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.