

ØKOLOGISKE KALVE PÅ GRÆS KRÆVER SÆRLIGT FOKUS OM EFTERÅRET

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Kalve og kvier over seks måneder skal som udgangspunkt være ude på græs indtil første november, når vejret, markens tilstand og hensyn til dyrenes velfærd tillader det.

Kvier og kalve kan derfor tages på stald i efteråret, når vejret og/eller græsmarkerne er våde eller hvis de mistrives. Det noteres i logbogen – eventuelt sammen med et billede af græsmarken, hvis det er årsagen.

Økologiske kalve, som ikke er fyldt seks måneder den 1. september, må tages på stald. Kalve, som fylder seks måneder i perioden fra 1. september til 1. november skal være ude – hvis det er muligt.

Er det praktisk muligt, er det en god løsning at kalvene går ude om dagen i mindst 6 timer og kommer ind på stald om natten i efterårsperioden.

FOKUS OG ANBEFALINGER


I perioden 1. september til 1. november er det særlig vigtigt at:

- Holde øje med tegn på hoste og diarré og gribe hurtigt ind med behandling

- Flytte kalvene til en ren mark eller på stald, hvis de hoster eller har diarré
- Tilpasse belægningsgraden, så der højst er 5-10 kalve per hektar
- Give tilskudsfoeder – f.eks. fri adgang til fuldfoder eller 1 – 1,5 kilo korn / kraftfoder per kalv per dag
- Foder- og vandtrug altid skal være rene og sikret mod forurening med gødning
- Tage kalvene på stald om natten, hvis praktisk muligt. Kravet er seks timer på græs om dagen.
- Tænke på muligheder for læ og ly

DATA VISER AT ØKOLOGISKE SMÅKALVE KAN HAVE DET SVÆRT OM EFTERÅRET

Tidligere opgørelser – se figuren – viser en overdødelighed hos økologiske småkalve mellem 6 og 8 måneder, som går på græs om efteråret. Forklaringen på en højere dødelighed kan være lunge- eller løbe-tarm-parasitter, som kommer særlig til udtryk når smittetrykket stiger sidst på sæsonen og hvor vejret samtidig er vådt og koldt.



Figur. Dødelighed hos økologiske og konventionelle kalve (6-8 måneder) gennem året

Se en [større opgørelse over dødelighed hos økologiske kalve i forhold til alder her](#).