

2. REGISTRERING AF BLADLUS I VINTERHVEDE OG VINTERBYG I UGE 39

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er pt. relativ få bladlus.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 5.-6. november. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der fundet bladlus i 6 af 24 undersøgte marker. I vinterbyg er der fundet bladlus i 3 af 18 marker. I marker med angreb er fundet 0,01 - 2 procent planter med bladlus. Der er således pt. relativ få bladlus.

Markerne undersøges bedst ved at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere "mørke pletter" på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen.

Der findes ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september. Jo tidligere såning jo større

risiko for angreb. Evt. bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet.

Se data og yderligere kommentarer:

[Vinterhvede](#)

[Vinterbyg](#)

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.