

5. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER DEN 24.-25. SEPTEMBER

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Der er udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 30 procent af markerne. Bekæmpelse kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet og indtil medio til ultimo september.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker på ca. 70 lokaliteter i planteavlskonstulenternes registreringsnet. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.

De gule fangbakker siger ikke noget om behovet for bekæmpelse rettet mod gnav fra de voksne rapsjordlopper i fremspiringsfasen. I år er rapsen ubejdset mod skadedyr, så man skal være ekstra opmærksom på evt. bladgnav. Den gamle tærskel for bekæmpelse rettet mod bladgnav af rapsjordlopper var 10 procent bortgnavet bladareal frem til at ca. 4 løvblade er udviklet. Tærsklen er dog lidt lavere, når udsæden ikke er bejdset, så man må holde øje med, om bladgnavene i etableringsfasen bliver for kraftige.


Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Optællingen starter først ca. 10 dage efter fremspiring, fordi æglægningen først begynder ca. 10 dage efter indflyvning til marken. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Pt. er tærsklen på 25 rapsjordlopper overskredet på ca. 30 procent af lokaliteterne. Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet og indtil medio til ultimo oktober. Bekæmpelsestidspunktet er således meget fleksibelt.

0,2 kg/ha Karate eller 0,1 kg/ha Kaiso Sorbie kan anvendes til bekæmpelse rettet mod larver.

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb.

Se [data og uddybende kommentarer](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2013-2018.

For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.