

8. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER DEN 15.-16. OKTOBER

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Bekæmpelsestærsklen er overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne. Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker på ca. 80 lokaliteter i planteavlskonulenternes registreringsnet. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppers larver.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Pt. er tærsklen på 25 rapsjordlopper fortsat overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne. Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet og indtil medio til ultimo oktober. Bekæmpelsestidspunktet er således meget fleksibelt.


0,2 kg/ha Karate eller 0,1 kg/ha Kaiso Sorbie kan anvendes til bekæmpelse rettet mod larver. Mavrik Vita har mindre god effekt og anbefales ikke.

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette

år var meget kraftige angreb.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.

Se [data og uddybende kommentarer](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2013-2018. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).





Billede 1. Minerfluelarver i bladstilke i raps fotograferet 12. oktober 2018 af Jens-Richardt Thyssen, LandboSyd. Larverne er lemmeløse og kan evt. forveksles med larver af rapsjordlopper, der har 3 par ben forrest og et mørkt hoved.





Billede 2. Minerfluelarver i bladstilke i raps fotograferet 12. oktober 2018 af Jens-Richardt Thyssen, LandboSyd. Ved kraftige angreb bliver de angrebne blade gule-rødlige og visner.