

9. REGISTRERING AF RAPSJORDLOPPER DEN 22.-23. OKTOBER

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Bekæmpelse rettet mod larver blev i år overskredet på 35 procent af lokaliteterne. Der skal nu ikke foretages flere registreringer.

Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker på ca. 80 lokaliteter i planteavlskonstulenternes registreringsnet. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for bekæmpelse rettet mod larver er en samlet fangst af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke inden for tre uger i hovedflyvningsperioden. Der lægges især mange æg i varme efterår.

Tærsklen på 25 rapsjordlopper er i år blevet overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne. Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet og indtil medio til ultimo oktober. Bekæmpelsestidspunktet er således meget fleksibelt.

I milde efterår er også set en relativ god bekæmpelseseffekt mod larver langt ind i november, men det anbefales at udføre bekæmpelsen senest i oktober.


0,2 kg/ha Karate eller 0,1 kg/ha Kaiso Sorbie kan anvendes til bekæmpelse rettet mod larver.

Mavrik Vita har mindre god effekt og anbefales ikke.

I figur 1 er udviklingen i år sammenholdt med tidligere år. 2008 er også medtaget, da der dette år var meget kraftige angreb.

Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.

Se [data og uddybende kommentarer](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008 og 2013-2018. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som de nuværende runde fangbakker).