

NYT OM SKADEGØRERE I MAJS I UGE 26

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Første registrering af angreb af bladsvampe er foretaget, og der er ingen eller kun meget svage angreb.

MAJSSVAMPE

Udviklingen af bladsvampe i majshelsæd følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede marker i 2018. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

Første registrering er foretaget. På nuværende tidspunkt bedømmes procent angrebne planter. Der er pt. ikke fundet angreb af majsøjeplet eller kun fundet meget svage angreb (5 procent angrebne planter i en upløjet mark). Der er ikke fundet angreb af majsbladplet og rust.

Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben samt procent dækning på dette blad. Der bedømmes også procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben.

Det gennemsnitlige vækststadium er 30, mens de længst udviklede marker er i vækststadium 37 (70 procent af maks. stængellængde nået).

Se registreringerne på nedenstående link:

- [Bladsvampe i majs](#)

MAJSHALVMØL

Der er udstationeret feromonfælder på 20 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet for at følge forekomsten af majshalvmøl. Der er denne uge fanget majshalvmøl på 12 af 20 lokaliteter med 1-9 majshalvmøl. Der er udstationeret i alt 6 fælder pr. mark. Der er 2 fælder med hver af 3 typer feromon. Næsten alle fangster er ved feromontype E, som er den mest almindelige type feromon hos majshalvmøl i Danmark.

Sammenhængen mellem fangster i fælderne og angreb i marken er desværre ikke kendt. Fælderne er sat op, fordi majshalvmøl er et nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt.

Fra Tyskland angives, at bekæmpelse skal udføres, når flyvningen toppe, og de første larver borer sig ind i stænglerne, men det angives, at tidspunktet ikke er så let at fastlægge. Æggene klækker ca. 10 dage efter, at de er lagt. Kun Steward er godkendt til bekæmpelse, og bekæmpelse er ikke hidtil skønnet nødvendig i Danmark.

Hold øje med evt. æg på undersiden af de midterste blade. De hvide æg lægges i hobe à 40 stk. og kittes sammen af et hvidt sekret.

Se registreringerne på nedenstående link:

[Majshalvmøl](#)

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.