

NYT OM SKADEGØRERE I MAJS OG ROER I UGE 29

**Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne**



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Angrebene af svampesygdomme i majs er fortsat svage. De første registreringer af angreb af bladsvampe i sukkerroer foretages i denne uge.

MAJSSVAMPE

Udviklingen af bladsvampe følges i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 14 pløjede og 7 upløjede majs-helsædsmarker i 2018. Alle marker har forfrugt majs. Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

På de tidlige vækststadier bedømmes kun procent angrebne planter. Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes yderligere procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben samt procent dækning på dette blad. Der bedømmes også procent dækning på de 2 blade over hhv. under kolben. Disse bedømmelser er nu foretaget i alle marker og tillægges udelukkende værdi på nuværende tidspunkt.

På bladene omkring kolben er der pt. ikke fundet majsbladplet eller rust. Der er kun i få tilfælde fundet majsøjeplet på bladene omkring kolben og kun svage angreb i de pløjede marker og

også relativ svage angreb i de upløjede marker.

I de pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Der er pt. ikke udløst bekæmpelse, hvilket heller ikke var forventet i det tørre vejr.

I de upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for angreb større, og bekæmpelse anbefales under disse dyrkningsforhold i de år, hvor der er normale nedbørsforhold. I år er mange marker dog tørkestressede, og bekæmpelse anbefales ikke i tørkestressede marker, selv om de er upløjede.

I upløjede marker med forfrugt majs, hvor der forventes et fornuftigt udbytte, kan bekæmpelse dog være aktuell, da nedbørsforholdene fremover ikke kendes. 2/3 af udbyttet af foderenheder i majshelsæd produceres i løbet af 8 uger efter afsluttende blomstring. I de første 4 uger efter afsluttende blomstring produceres ca. 1/3 af udbyttet i foderenheder. I de sidste 4 uger produceres den sidste ca. 1/3 af udbyttet af foderenheder.

Beslutning om evt. bekæmpelse skal senest træffes i vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse og vækststadium 65 (fuld blomstring) for Comet Pro og Opera.

Det gennemsnitlige vækststadium er 60 (hanblomsterstand fuldt udfoldet), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 65 (fuld blomstring).

Se registreringerne på nedenstående link:

- [Bladsvampe i majs](#)

MAJSHALVMØL

Der er udstationeret feromonfælder på 20 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet for at følge forekomsten af majshalvmøl. Der er denne uge fanget majshalvmøl på 5 af 19 lokaliteter med 1-5 majshalvmøl. Der er udstationeret i alt 6 fælder pr. mark. Der er 2 fælder med hver af 3 typer feromon. Næsten alle fangster er ved feromontype E, som er den mest almindelige type feromon hos majshalvmøl i Danmark.

Sammenhængen mellem fangster i fælderne og angreb i marken er desværre ikke kendt. Fælderne er sat op, fordi majshalvmøl er et nyt skadedyr i Danmark, og udbredelsen ønskes derfor fulgt.

Fra Tyskland angives, at bekæmpelse skal udføres, når flyvningen topper, og de første larver borer sig ind i stænglerne, men det angives, at tidspunktet ikke er så let at fastlægge. Æggene klækker ca. 10 dage efter, at de er lagt. Kun Steward er godkendt til bekæmpelse, og bekæmpelse er ikke hidtil skønnet nødvendig i Danmark.

Hold øje med evt. æg på undersiden af de midterste blade. De hvide æg lægges i hobe à 40 stk. og kittes sammen af et hvidt sekret. Æglægningen kan ske over en lang periode.

Forekomsten af majshalvmøl følges 2 uger endnu.

Se registreringerne på nedenstående link:

- [Majshalvmøl](#)

ROER

Første registrering af angreb af bladsvampe foretages fra torsdag i indeværende uge, dvs. fra den 19. juli.

Se registreringerne fra torsdag på nedenstående link:

- [Bladsvampe i sukkerroer](#)

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.
