

AP 3 FORHØJET KALVEDØDELIGHED OG KODØDELIGHED

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Alarmside til døde køer og kalve.

Drejer det sig om økologiske kalve så læs [her](#).

Måske har der sneget sig u hensigtsmæssige arbejdsgange ind, der spænder ben for de ellers velkendte retningslinjer for pasning af småkalve:

Tjekliste:

- Er kælvningsboksen ren nok, eller svækkes kalvene allerede fra start?
- Er mængden af råmælk til nyfødte kalve faldet, eller får de stadig 4 liter?
- Får **alle** nyfødte kalve råmælk inden for 4 timer?
- Anvender kalvepasseren brixmåleren korrekt, så der sikres en værdi på mindst 22?
- Bliver mælkemængden til de små kalve øget allerede når dagstemperaturen er under 15 grader?
- Har kalvene strøelse nok til at holde sig varme i de kolde nattetimer, eller skal strøelsestidspunktet rykkes til senere på dagen?
- Er kalvepasseren opmærksom på risikoen for at sprede smitte via fx beskidte hænder eller tøj?

Lad gerne kalvepasserne tage SEGES' gratis digitale kursus i kalvepasning.

Du finder det på både dansk og engelsk [her](#).

Der er også et modul om hensigtsmæssig ledelse af kalvepasningen.

TILTAG

For at styrke kalvenes immunforsvar og øge sundheden i kalvestalden kan I:

- Tildele råmælk flere gange. Råmælk af ringere kvalitet kan bruges til 2. og 3. tildeling
- Foretage blodprøvning af kalvene for at afklare, om de optager tilstrækkeligt med antistoffer
- Sikre en endnu bedre hygiejne i kalveboksene. [Se film om korrekt desinfektion her](#) og om hvordan du laver en [korrekt brugsopløsning af desinfektionsmidlet her](#).
- Gøre en særlig indsats for at opdage tidlige tegn på lungeinfektion. [Se mere i filmen her](#)

FORHØJET KODØDELIGHED

Det kan være vanskeligt at fastslå årsagen til forhøjet kodødelighed.

Det kan derfor være en god ide at kontakte din dyrlæge eller rådgiver for en grundig analyse af, hvad der er årsagen til den forhøjede kodødelighed.

Eventuelt kan en obduktion give en forklaring på årsagen til den uheldige udvikling.

Er dødeligheden særlig vanskelig at få bugt med kan særligt uddannede kvægrådgivere og dyrlæger kontaktes. [Se en liste over dem her](#).

FOREBYGGENDE TILTAG

- I sommerperioden stiger andelen af køer der dør som følge af yverbetændelse. Vær derfor særlig opmærksom på:
 - De tidlige tegn på yverbetændelse
 - Optimal båsehygiejne
 - Optimal malkehygiejne – [se pjecen her](#)Se også artiklen [Hjælp køerne i de varme perioder](#)
- Mange køer dør og aflives på grund af halthed. Tag derfor stilling til, om klovsundheden kan forbedres i din besætning. Vend emnet med din dyrlæge, din klovbeskærer eller se mere på www.sundklov.dk
- I overgangsperioden fra én laktation til den næste er koen som bekendt yderst sårbar. [Læs mere i artiklen her](#) eller se mere i [Dansk anbefalinger for management af goldkøer](#)
- Overvej om dine medarbejdere har de rette kompetencer. [Læs mere her](#).

Se også mere på [LandbrugsInfos side om ko- og kalvedødelighed](#).
