

Ny høst

Det har været en tør og let høst de fleste steder, som har givet akssvampe små muligheder for at udvikle sig. Ved brug af eget korn eller iblanding af korn bør konsistens og lugt alligevel undersøges. Hvis der er tvivl, skal partiet undersøges.

Årets høst er ved at være overstået, og kvaliteten skal vurderes. Dette omfatter risikoen for lagersvampe og fusariumtoksin i kornet fra marken. Det har været en tør og let høst de fleste steder, som har givet akssvampe små muligheder for at udvikle sig. Ved brug af eget korn eller iblanding af korn bør konsistens og lugt alligevel undersøges. Hvis der er tvivl, skal partiet undersøges.

Fjerkræafgiftsfonden



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Grænseværdier for fuldfoder

Det er ikke muligt at sammenfatte en konkret entydig konklusion af, hvor lang tid de enkelte dyregrupper kan tåle specifikke koncentrationer af toksiner, før symptomer på forgiftning opstår. Påvirkningen afhænger af varighed af udfodringen og dagsdosis.

De nuværende anbefalede grænseværdier for fusarium-toksinerne har i enkelte studier kunnet påvirke reproduktionen, dog kun efter længere tids påvirkning. Oftest har studierne omfattet meget få dyr, hvorfor konklusionerne også er mindre sikre. De nuværende anbefalinger opfattes som tilstrækkelige, såfremt specielt polte kun udsættes for toksinerne i kortere perioder.

Der findes endnu ingen vejledende maksimale grænseværdier for nivalenol.

Ved en analyse og vurdering er det væsentligt at være opmærksom på, at effekten af toksinerne forværres, jo flere toksintyper der er. Yderligere beskrives det flere steder, at unge dyr som regel er mere følsomme over for toksiner end ældre dyr - dette er dog ikke entydigt.

Svin og fjerkræ er mere følsomme end kvæg, hos Lufa kan vi få analyseret korn og foderstoffers indhold af forskellige toksiner.

Det er endnu ikke et problem i årets høst!

Sygdomssymptomer på de risikable toksiner

Kilde: [Svampetoksiner i foder til slagtekyllinger - er der grund til bekymring?](#), LandbrugsInfo

Aflatoksin

- Leverskader og nedsat leverfunktion.
- Reduceret vækst.
- Nedsat immunforsvar.
- Hudlæsioner.
- Mangelfuld blodkoagulering.
- Rakitis og nedsat knoglestyrke.
- Nedsat ægproduktion og klækning.
- Død.

Ochratoxin A

- Nyreskader og nedsat nyrefunktion.
- Øget vandoptagelse og våd strøelse.
- Nedsat ægproduktion.
- Nedsat immunitet.
- Påvirkning af proteinsyntesen.
- Nedsat knoglestyrke.
- Akkumulering af urinsyresalte.

Zearalenone

- Forringet skalkvalitet.
- Påvirkning af reproduktion.
- Påvirkning af vit. D3 omsætningen.
- Høj dødelighed.

Forfatter: Niels Provstgård, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ