



## PROBLEMER MED KANIBALISME OG FJERPILNING

STØTTET AF

# Fjerkræafgiftsfonden

Det er nu 1,5 år siden, at næbtrimning stoppede fuldstændigt i DK. Hvordan er det så gået? Heldigvis er det gået godt i de fleste flokke, men der har desværre også været flokke med alvorlig kannibalisme og fjerpilning.

### Kannibalisme

Vi har registreret 10 tilfælde af kannibalisme inden for det seneste år, heraf 7 flokke af hvide høner, hvor udbruddet startede i slutningen af opdrætsperioden og er accelereret efter flytningen. Disse udbrud har, på nær ét, kunnet stoppes hurtigt via næringsstofrigt foder, fiskemel og tilsætning af salt til drikkevandet i en kort periode, kombineret med lysdæmpning. Det er således ikke gået så galt med kannibalsmen, men hønerne fortsatte med at udføre alvorlig fjerpilning, og flokkene vil sandsynligvis ende med at være stærkt fjerpillede inden de udsættes.

Hos yderligere 3 flokke af brune skrabe- og frilandshøner udbrød kannibalsmen senere i forløbet, og den skyldes formodentlig en foderfejl. Vi har kun et perifert kendskab til disse flokke, og skal derfor ikke kommentere nærmere herpå.

Til spørgsmålet, om kannibalisme udbruddene i førstnævnte 10 flokke skyldes ophør af næbtrimning, skal bemærkes, at 5 af de 10 tilfælde forekom i økologiske flokke, hvor man i forvejen ikke plejer at næbtrimme. Økologerne har ellers ikke haft problemer med kannibalisme i de sidste mange år, så noget tyder på, at én eller flere ukendte faktorer, ud over næbtrimning, har spillet ind. Udfra de tilgængelige oplysninger kan ingen bestemt opdrætter, foderleverandør eller høneafstamning, forbindes med kannibalsmeflokkene.

## **Fjerpilning**

En række skrabeægsproducenter har oplevet stigende problemer med fjerpilning efter ophør med næbtrimning. Om fjerpilningen skyldes den manglende næbtrimning er tvivlsomt. Høner kan sagtens pille fjer, selvom de er næbtrimmede. Det ser mere ud til at problemerne kan relateres til en foderleverandør.

## **Behov for at sætte fokus på management**

Det seneste års problemer med fjerpilning og kannibalisme peger på, at der er nogle management procedurer, vi skal have kigget på. I de fleste registrerede tilfælde af kannibalisme synes problemet grundlagt allerede i opdrætsperioden. Der kan derfor være noget omkring opdrætsprogrammet, der skal rettes til, men herudover skal man også erkende, at starten af læggeperioden er uhyre stressende for hønen, da den inden for et par uger skal øge foderoptagelsen fra 70 g til 120 g foder pr. dag for at få dækket sit næringsstofbehov. Hønerne er oftest ikke i stand til at øge foderoptagelsen hurtigt nok, og kommer derfor i næringsstoffunderskud. Dette underskud af næringsstoffer øger risikoen for fjerpilning og i værste fald kannibalisme. Det er i øvrigt konstateret, at især de hvide flokke ikke kan holde kropsvægten, de taber sig gennem hele produktionsperioden, og er stærkt undervægtige ved udsætning. Der er et stort behov for at ægbranchen sætter fokus på disse problemer, og afsætter midler til at løse dem.