

Indsats mod spolorm hos konsumægshøner

I løbet af 2016 har ægbranchen modtaget usædvanlig mange klager fra forbrugere, der har fundet spolorm i konsumæg. Derfor organiserer branchen nu screening af gødning fra høneflokkene, der leverer til ægpakkerierne, med henblik på reduktion af ormebyrden hos hønerne. Den fælles indsats giver den bedst mulige pris for analyserne.

Tidligere blev behandling mod orm iværksat ved fund af en vis mængde ormeæg i gødningen. En gennemgang af resultaterne af månedlige analyser af gødning fra 10 konsumægsklokkene i løbet af 2016 har ført til en anbefaling om at behandle også i de flokke, hvor der kun findes ganske få spolormeæg. Midt i 2017 vil resultaterne af denne procedure blive evalueret.

Gødningsprøverne indkaldes efter denne plan:

1. Første gødningsprøve undersøges inden opdrættet flyttes
2. Anden prøve undersøges 6 uger efter flytning
3. Efterfølgende prøver udtages hver 8. uge

Ved positivt fund behandles flokken

Udtagning af prøver

Der indsamles mindst 25 friske gødningsklatter fordelt i hele huset. Brug en tæt plasticpose. Pres luften ud, luk med en knude og læg posen i en ren plasticpose. Afleveres til pakkeribilen sammen med æggene på aftalt tidspunkt.

Muligheder for behandling

De ormemedikamenter, der er til rådighed, tilhører samme gruppe (benzimidazol). Der er tre produkter på markedet i Danmark – Panacur Aquasol, Verminator og Flubenol vet. De to førstnævnte gives i drikkevandet, mens Flubenol gives i foderet. I alle tilfælde er tilbageholdelsestiden for æg 0 dage ved anbefalet dosering.

Medicinering

For drikkevandsmedicinering:

- Overhold daglig dosering beregnet af dyrlægen
- Medicinér over 4 timer på det tidspunkt, hvor hønerne drikker mest
- Stamopløsningen skal omrøres omhyggeligt, for Verminator hver halve time
- Vandsystemet rengøres før og efter medicinering

For fodermedicinering:

- Overhold daglig dosering beregnet af dyrlægen
- Medicinér over hele dagen i 7 dage

161018/SKa