

KLØVERANDEL

Visuel bedømmelse i afgræsningsmarken

VEJLEDNING





Hæftet er vejrbestandigt og tages med i afgræsningsmarken til bedømmelse af kløverandel.

Hæftet er inddelt i fire perioder: forår og sommer (forsider) samt sensommer og efterår (bagsider). For hver periode findes en palette af sider inddelt i intervaller med forskellig kløverandel. For hvert interval er der et antal fotos, som sammenholdes med det, du ser i marken.


Når du har fundet det foto, der ligner det, du ser i marken, finder du på fotoet andel af hhv. hvid- og rødkløver af en samlet prøve, og du får herved et bud på kløverandelen i din mark. Vær opmærksom på, at der kan være tale om forskellige blandinger, afgræsningshøjde og varighed siden afgræsning på fotos.

Kløverandelen er bestemt ved botanisk analyse med tørring og vejning. Ikke alle sider er komplette, og værktøjet kan suppleres med yderligere fotos.





EFTERÅR (oktober, november). Kløverandel 40-60 procent






FORÅR (april, maj). Kløverandel 0-10 procent







EFTERÅR (oktober, november). Kløverandel 20-40 procent







FORÅR (april, maj). Kløverandel 10-20 procent






EFTERÅR (oktober, november). Kløverandel 0-20 procent






FORÅR (april, maj). Kløverandel 20-30 procent




SENSOMMER (aug., sept.). Kløverandel 80-100 procent






SOMMER (juni, juli). Kløverandel 0-20 procent




SENSOMMER (aug., sept.). Kløverandel 60-80 procent






SOMMER (juni, juli). Kløverandel 20-40 procent



SENSOMMER (aug., sept.). Kløverandel 40-60 procent





SOMMER (juni, juli). Kløverandel 40-60 procent



SENSOMMER (aug., sept.). Kløverandel 20-40 procent



SOMMER (juni, juli). Kløverandel >60 prosent



SENSOMMER (aug., sept.). Kløverandel 0-20 procent

