



Bekæmpelse af ukrudt i frøgræs

Målet bekæmpelsen af ukrudt mod de arter, hvis frø ikke kan renses fra græsfrøene. Vær også opmærksom på Frøafgiftsfonden arter, der kan give udbyttetab, høstbesvær eller forøge frøpuljen i jorden. Bekæmp ukrudtet tidligst muligt, når det er i vækst.

På grund af den tidlige og lange vinter med megen sne lykkedes det ikke alle at få udført behandlinger med Reglone i løbet af december og januar. Derfor er der i mange marker overvintrende græsukrudt. Rapgræsserne er et stort problem i specielt engrapgræs, men også i rødsvingel, fordi arterne kan påvirke kvaliteten i den høstede vare. Eneste mulighed for at dæmpe problemet på nuværende tidspunkt er anvendelsen af Hussar OD. Effekten på alm. rapgræs er meget begrænset, medens effekten på enårig rapgræs er bedre. Det er vigtigt, at behandlingen udføres tidligt, så snart planterne er i vækst, og der ikke er udsigt til hård nattefrost. Forsøg viser, at Hussar OD ikke er specielt temperaturfølsom når det gælder bekæmpelse af enårig rapgræs. Doseringen afpasses efter størrelsen på ukrudtet. Behandlingen kan eventuelt udføres som en splitsprøjtning, hvor man efter 2-3 uger vurderer resultatet og et eventuelt behov for opfølgning.



Billede 1 og 2. I veletablerede marker kan det være tilstrækkeligt at behandle køresporene, hvor enårig rapgræs ofte etablerer sig, når afgrøden bliver skadet af kørsel. Her ses samme kørespor midt i maj og midt i juni efter behandling i april med 0,1 l Hussar OD pr. ha i køresporet. To dyser over hvert sprøjtespor har været åbne.

Det er vigtigt at få bekæmpet arter, som ikke - eller kun vanskeligt - kan frarenses. Se en [oversigt](#) over de aktuelle arter. Haremad og skræppe er vanskelige at frarenses i alle de storføede græsarter.

Dernæst skal de arter bekæmpes, som forekommer i så store mængder, at der er risiko for direkte udbyttetab, høstbesvær eller kraftig forøgelse af frøpuljen i jorden.
De ukrudtsplanter, som forekommer i mindre antal, og hvis frø kan frarenses, vil det ikke være økonomisk rentabelt at bekæmpe.

Middelvalg

I tabel 1 ses en oversigt over, hvilke midler der er relevante mod de vigtigste ukrudtsarter i frøgræs, mens tabel 2 er en samlet oversigt over godkendte midler i frøgræs. For off-labelgodkendelser gælder, at avleren skal være i besiddelse af off-label vejledning, som kan hentes i [Middeldatabasen](#).

Tabel 1. Basismidler mod en række tokimbladede ukrudtsarter i frøgræs.

Agerstedmoder	DFF/Diflamil/Legacy
Fuglegræs	Primus , Ariane FG S , Tomahawk 180 EC/Lodin , Starane XL
Haremad	Primus , Ariane FG S
Hønsetarm	Primus , Ariane FG S
Kamille	Primus
Skræppe	Tomahawk 180 EC/Lodin , Starane XL
Storkenæb	Primus , Ariane FG S
Vejbred	Primus , Ariane FG S
Ærenpris	DFF/Legacy / Diflamil

Tabel 2. Midler til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og græsukrudt i frøgræs om foråret.

	Tekst på etikette	Frøgræs udlagt i renbestand i efteråret	Frøgræs udlagt i korn	Frøgræs udlagt i alle afgrøder	2. – flerårsfrø eller efter høst af hvidkløver
Dosis, g pr. liter pr. ha					
Ariane FG S	Kun om foråret efter høst af korn, hvidkløver eller frøgræs		2,50		3,50

Ariane Super	Frøgræs	1,5-1,75	1,5-1,75	1,5-1,75	1,5-1,75
Fighter 480	Frøgræs	2,00	2,00	2,00	2,00
Basagran M75	Frøgræs	2,60	3,0-4,0	3,0-4,0	3,0-4,0
Briotril 400 EC	Frøgræs	0,5-0,75	0,5-0,75	0,5-0,75	0,5-0,75
Catch	Alm. rajgræs, ital. rajgræs, hybridrajgræs, rødsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, engrapgræs, alm. rapgræs, hundegræs og timothe (off-label)	0,6	0,6	0,6	0,6
DFF/Diflanil/ Legacy	Frøgræs (off-label)	0,07-0,15	0,07-0,15	0,07-0,15	0,07-0,15
Focus Ultra	Rødsvingel og stivbladet svingel		1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0
Fusilade Max	Rødsvingel, stivbladet svingel		1,0-1,5	1,0-1,5	1,0-1,5
Hussar OD	Engrapgræs, rødsvingel, stivbladet svingel og bortsprøjtning af hvidkløver(off-label).	0,05-0,1	0,05-0,1	0,05-0,1	0,05-0,1
MCPA	Følgende forår efter høst af hvidkløver eller frøgræs.				2,7
MCPA	Forår efter høst af dæksæd		0,70		
Monitor	Alm. rajgræs (off-label)	5 g	5 g	5 g	5 g
Monitor	Engrapgræs (off-label)	9 g	9 g	9 g	9 g
Oxitril CM	Frøgræs	0,2	0,2	0,2	0,2
Primera Super	Alm. rajgræs og strandsvingel forår(off-label).	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0	0,5-1,0
Primera Super	Strandsvingel forår (off-label).	0,5-0,8	0,5-0,8	0,5-0,8	0,5-0,8
Primus	Alm. rajgræs, engrapgræs, rødsvingel (etikette). Alm. rapgræs, engsvingel, hybrid rajgræs, hundegræs, ital. rajgræs, rajsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, timothe (off-label).	0,075-0,150	0,075-0,150	0,075-0,150	0,075-0,150
Starane XL	Alm. rajgræs, engrapgræs, rødsvingel. Alm. rapgræs, engsvingel, hybrid rajgræs, hundegræs, ital. rajgræs, rajsvingel, stivbladet svingel, strandsvingel, timothe (off-label).	1,5-1,8	1,5-1,8	1,5-1,8	1,5-1,8
Tomahawk 180 EC/Lodin	Græsarealer	0,7-0,8	0,7-0,8	0,7-0,8	0,7-0,8

Løsningsforslag

Det er ofte nødvendigt at anvende høje doser, når det er store overvintrede ukrudtsplanter, der skal bekæmpes. Er ukrudtsplanterne små, og vejrbetingelserne gode, kan der anvendes lavere doser. Primus og DFF virker ved lav temperatur. Midler med indhold af 'hormonvirkende' aktivstoffer som Ariane FG, Catch, Starane XL og Tomahawk 180/Lodin kræver gode temperaturforhold for optimal virkning.

Forslag til løsninger mod en række almindelige ukrudtsproblemer er angivet her:

- [Alm. rajgræs](#)
- [Engrapgræs](#)
- [Engsvingel](#)
- [Fåresvingel](#)
- [Hundegræs](#)
- [Hvene](#)
- [Ital. rajgræs](#)
- [Rødsvingel](#)
- [Stivbladet svingel](#)
- [Strandsvingel](#)
- [Timothe](#)

By Rich Haddock

[Til top](#)