

De nyeste off-label godkendelser

Indenfor den sidste uge er der offentliggjort en række godkendelser til mindre anvendelse.

Der er kommet en række nye off-label godkendelser, og en af godkendelserne er til Diflufenican til purløg til frøproduktion.

Aktivstoffet diflufenican er blevet godkendt i de tre produkter DFE, Legacy 500 SC og Diflanil 500 SC. Midlerne må anvendes i perioden oktober til februar.

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug, Plante- og Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlerne DFE, Legacy 500 SC og Diflanil 500 SC til anvendelse i purløg til frøproduktion.

Man skal være opmærksom på, at diflufenican kun må anvendes én gang pr. sæson i afgrøden samt at der kan være begrænsninger for



Purløg til frø er ikke nogen stor afgrøde på de danske marker og de godkendte sprøjtemidler er begrænsede. Miljøstyrelsen har imidlertid netop givet en off-label godkendelse til tre ukrudtsmidler, som indeholder diflufenican. (Foto: Bøje Østerlund).

etablering af efterfølgende afgrøde.

Miljøstyrelsen understreger, at brugerne før anvendelsen af midlerne skal være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, som findes i Middeldatabasen.

Reglone i frøafgrøder.

En række græs- og kløverfrøafgrøder har fået en godken-

delse til mindre anvendelse af Reglone til bekæmpelse af visse græsarter. Det kan være bekæmpelse af enårig rapgræs, almindelig rapgræs og væselhale.

Reglone skal udsprøjtes om vinteren, når afgrøden har standset væksten. Det kræver en forudgående kuldeperiode at stoppe væksten, og det er særlig vigtigt i svage marker

og i plænetyper af engrapgræs. Ellers kan det medføre skade på afgrøden.

Reglonesprøjtningerne skal udføres på dage med klart vejr og sol. Det nedsætter risikoen for afgrødeskader og fremmer effekten af Reglone. Da Reglone er et kontaktmiddel skal der anvendes rigeligt med vand med op til 300 liter pr. hektar.

I veludviklede engrapgræsmarker kan anvendes 1,7 -2,0 liter Reglone pr. hektar eventuelt tilsat lidt sprede/klæbemiddel. Højest dosering på stort ukrudt i kraftige marker.

Rødsvingel

Reglone har fået en off-label godkendelse i flerårsmarker af rødsvingel til bekæmpelse af væselhale. Behandlingen udføres efter væksten er stoppet i december eller januar.

Det er vigtigt kun at behandle områder af rødsvingelmarken, hvor væselhale

virkelig er et problem, da Reglone kan medføre udbyttetab i afgrøden. En behandling af områder uden væselhale vil medføre udbyttetab.

I de kløverarter, hvor Reglone må anvendes, bruges altid den højeste dosering på 2,0

liter pr. hektar. I foråret er der i kløverarterne kun begrænsede muligheder for bekæmpelse af to-kimbladet ukrudt og ingen muligheder for at bekæmpe græsukrudt.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 26

ALTERNATIVER TIL REGLONE

Hvis risikoen for skader på afgrøden vurderes til at være for stor til anvendelse af Reglone fra december til februar, er der følgende muligheder i foråret:

- Enårig rapgræs: Hussar OD er off-label godkendt i rødsvingel, engrapgræs og har en godkendelse til mindre anvendelse i hundegræs om foråret.
- Alm. rapgræs: Monitor har en off-label godkendelse i engrapgræs. Midlet har en god effekt på alm. rapgræs, men er helt utilstrækkelig på en-årig rapgræs. Dosering skal afpasses efter forholdene.
- Væselhale: Her er Reglone eneste mulighed.

Kilde: Videncentret for Landbrug

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.