

Høsttidspunktet af kløver- og græsfrø bestemmes af datoen for skridning

Det er vigtigt at finde det rigtige høsttidspunkt for at få det største udbytte.


Frøafgiftsfonden

Frø skal høstes, når spildet af frø er lige så stort som tilvæksten af frø. Ved høst spildes der mindst frø, når der høstes i højt og solrigt vejr. Pas på, da mejetærskeren kan spilde over solde såvel som halmryster.

Indlejring og frøspild

Figur 1 viser modningsforløbet for alm. rajgræs, men princippet er det samme for de øvrige græsarter. Risikoen for frøspild afhænger meget af frøarten og i nogen grad af sorten. Frøspildet påvirkes også af, om afgrøden er opretstående eller gået i leje.

Det største udbytte fås ved at høste, når frøtilvækst og frøspild er lige store.



Figur 1. Modningsforløb i alm. rajgræs fra skridning over grøn- og gulmodenhed.

Kendetegn ved modning – høst

Tabel 1. Kendetegn til bestemmelse af græsfrøets udvikling.

Frø	Kernen	Drysning	Strå	Vandindhold i frøet, procent
Grøn umoden	Mælkeagtig	Ingen	Grønt	45-50
Tidlig grønmoden	Voksbld (cremeosteagtig)	Ingen	Grønt	35-45
Grønmoden	Voksagtig	Begyndende	Grønlgt	25-35
Gulmoden	Fast (osteagtig)	En del	Gullgt	20-25
Fuldmoden	Fast/hård	Meget	Gult/tørt	Under 20

Skridning, blomstring og høst

I tabel 2 er der en oversigt over, hvornår det kan forventes, at de forskellige græsser skrider, blomstrer og kan være klar til at blive høstet. Ved at notere datoerne for skridning og blomstring vil det være muligt at beregne, hvornår det kan forventes, at afgrøden er klar til høst.

Høsttidspunktet af kløver- og græsfrø kan beregnes ud fra skridningsdatoen. Fra skridning til skårlægning går der ca. 44 dage og fra skridning til direkte tærskning går der ca. 52 dage.

Tabel 2. Frøarternes udvikling fra skridning til høst.

Frøart	Skridnings-Interval	Dage mellem skridning og blomstring	Dage mellem blomstring og gulmodenhed	Forventet dato for høst (Egne notater)
Alm. rajgræs, tidlig	5/5-5/5	15	33	
Alm. rajgræs, middeltidlig	15/5-25/5	15	33	
Alm. rajgræs, sildig	25/5-5/6	15	33	
Italiensk rajgræs	19/5-28/5	15	30	
Hybrid rajgræs	17/5-26/5	15	30	
Timothe	23/5-2/6	19	35	
Hundegræs	9/5-17/5	21	27	
Engsvingel	19/5-23/5	15	24-29	
Rødsvingel	27/4-15/5	21	24	
Bakkesvingel	16/4-1/5	20	25	

Engrapgræs	9/5-17/5	16	24-29	
Rødkløver			38-44	
Hvidkløver			21-28	
Strandsvingel	15/5-25/5	18	28	

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.