



[Hjem](#) > [Frøafgiftsfonden](#) > [2013](#) > [Frøavlsrådgivning og -information](#) > **Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2013**

Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2013

Lagersituationen og efterspørgslen på verdensplan indikerer attraktive priser på alm. rajgræs. Ved udlæg af alm. Frøafgiftsfonden rajgræs uden dæksæd i august er der stadig mulighed for at få etableret en økonomisk attraktiv afgrøde til høst 2014.

Markedssituationen tegner positivt for alm. rajgræs, og det bør medføre pæne priser og dermed god økonomi for avleren til høst 2014.

Kontrakt

Specielt for nye frøavlere er det vigtigt at tage sig god tid til at gennemgå kontrakten med frøkonsulenten og gøre sig klart, hvilke betingelser der gælder for avl af frøgræs, så begge parter får afstemt deres forventninger til samarbejdet.

Etablering

Alm. rajgræs skal etableres i sidste halvdel af august. Det gælder specielt plænetyperne. De tidlige kraftigt voksende tetraploide fodertyper kan eventuelt etableres de første dage i september, men så bør det være slut.

Udsædsmængden er sortsspecifik, men ved efterårsudlæg i renbestand skal udsædsmængden øges lidt i forhold til samme sort etableret i vårbyg om foråret. Frøfirmaet giver gerne de nødvendige oplysninger.

Hvis frøet etableres efter en kornafgrøde, skal der pløjes meget omhyggeligt før såning. Husk at pakke jorden. Specielt spildhvede kan ellers blive et meget stort problem i frøafgrøden. Der er ikke mange muligheder for bekæmpelse.

Etableres frøet efter en bredbladet forfrugt, er pløjning ikke helt så afgørende.

Ukrudt

Det er meget vigtigt at eventuelt græsukrudt bekæmpes effektivt allerede fra efteråret. [DFF](#), [Diflanil](#), [Legacy](#), [Stomp/Activus](#) og [Boxer](#) er midler, der kan anvendes i henhold til deres off-label godkendelser, som kan findes i [Middeldatabasen](#). Husk at have vejledningen liggende før brug af midlet. Alle midler har jordvirkning. Småt ukrudt og jordfugt fremmer effekten. DDF/Diflanil/Legacy skal udbringes umiddelbart efter såning, hvor jorden endnu er fugtig for at sikre effekten på enårig rapgræs.

Sygdomme

Swampesygdomme er sjældent et problem i alm. rajgræs om efteråret.

Skadedyr

Fritfluer kan blive et problem, men der varsles for 3. generation, og bekæmpelse er meget sjældent nødvendig.

Gødskning

For at sikre en passende udvikling af planterne til vinter kan der tilføres kvælstof i forbindelse med såning. Specielt plænetyper og afgrøder, der er etableret sent i forhold til det optimale, bør tilføres 25-30 kg kvælstof pr. ha.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.