



Hjem > Frøafgiftsfonden > 2013 > Gødningsstrategi > Udnyt det kolde og tørre vejr til første tildeling af kvælstof til økologisk rajgræs

Udnyt det kolde og tørre vejr til første tildeling af kvælstof til økologisk rajgræs

Normalt anbefales det ikke, at gødske økologisk alm. rajgræs før den 20. marts for at undgå problemer med for meget bladvækst og bundgræs i afgrøden.

Den aktuelle vejrsigt med tørt og vedvarende koldt vejr med nattefrost og tøvejr om dagen, gør det imidlertid relevant, at overveje en delt gødskning og en fuld gødskning på arealer, hvor der normalt ikke kan køres i det helt tidlige forår.

Normalt skal gødskning af alm. rajgræs ikke ske, før afgrøden er i vækst, og der kan køres på arealet uden risiko for transportskade. Det vil i "normale" år være fra den 20. marts og frem til den 1. april. Læs mere om gødskning af alm. rajgræs [her](#)

I år er situationen imidlertid den, at der fortsat er udsigt til en lang tør periode med nattefrost, hvilket betyder, at planterne ikke kommer i egentlig vækst nu, selvom de får noget gødning. Det åbner for den mulighed, at udbringe enten noget af gødningen nu eller give det hele af en gang.

I følgende situationer vil det være oplagt, at tildele alt gødningen af én gang, så snart der kan køres:

- Gødningen er kvæggylle
- Marken er traditionelt længe om at blive tør nok til at kunne bære gyllevognen

I følgende situationer vil det være bedst at dele gødningen:

- Gylle med lavt kvælstofindhold, så mængden alene berettiger til to udbringninger
- Svinegylle som hurtigt optages i planterne

Desto mere kvælstof en rajgræsmark tilføres desto større er risikoen for bundgræs i afgrøden til høst, hvilket er besværligt i forhold til direkte høst. Erfaringerne fra praksis viser også, at for tidlig udbring af let plantetilgængeligt gødning, som svinegylle, kan medføre for meget bundgræs.

Der for bør man ikke køre mere end 50–75 pct. af den planlagte svinegylle til rajgræsset ud på nuværende tidspunkt og så vente med den sidste del til perioden 20. marts–1. april. Optimalt tildeles 75 pct. af kvælstoffet nu, men det afhænger af gyllens kvælstofkoncentration, da der kan blive for lidt mængde at køre med ved anden udbringning.

Det er vigtigt at frøgræsset har tilstrækkeligt med tilgængeligt kvælstof til rådighed, når væksten starter, så der kan dannes det nødvendige antal frøbærende stængler og sikre en god konkurrenceevne over for græsukrudt.

Ved senere udbringning af husdyrgødning end 1. april er der en øget risiko for, at der kommer en længere tørvejrperiode, så kvælstoffet ikke bliver optaget i planterne før end på et senere tidspunkt, hvilket også giver u hensigtsmæssigt meget bundgræs.

Det er vigtigt, at gyllen ikke udbringes på en måde, så man risikerer afstrømning fra marken, og man skal altid huske at overholde regler for gylleudbring, som der kan læses mere om [her](#)

Frøafgiftsfonden



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'