



UDLÆG AF ALM. RAJGRÆS I RENBESTAND I EFTERÅRET 2015

STØTTET AF

Frøafgiftsfonden

Efterspørgslen efter arealer til udlæg af alm. rajgræs i renbestand efterår 2015 til høst 2016 vil være begrænset. Bliver du alligevel tilbudt en kontrakt, er alm. rajgræs fortsat et attraktivt alternativ til kornafgrøder.

Efter nogle år med gode udbytter i alm. rajgræs og behersket efterspørgsel på markederne er der fortsat ret store frølagre af alm. rajgræs. Dermed er behovet for arealer til efterårsudlæg i renbestand også begrænset. Skulle man alligevel få mulighed for at gå ind i en kontrakt, er der forskellige forhold, man skal være opmærksom på.

KONTRAKT

Specielt for nye frøavlere er det vigtigt at tage sig god tid til at gennemgå kontrakten med frøkonsulenten og gøre sig klart, hvilke betingelser der gælder for avl af frøgræs, så begge parter får afstemt deres forventninger til samarbejdet.

ETABLERING

Alm. rajgræs skal etableres i sidste halvdel af august. Det gælder specielt plænetyperne. De tidlige kraftigt voksende tetraploide fodertyper kan eventuelt etableres de første dage i september, men så bør det være slut. Høsten 2015 ser ud til at blive relativt sen. Derfor kan det

blive vanskeligt at få etableret frømarken på det optimale tidspunkt. Gå aldrig på kompromis med såtidspunktet.

Udsædsmængden afhænger af sort, type og såtid, men ved efterårsudlæg i renbestand skal udsædsmængden øges lidt i forhold til samme sort, etableret i vårbyg om foråret. Frøfirmaet giver gerne de nødvendige oplysninger til den pågældende sort.

Sådybden er 2 til 3 cm. De storfrøede tetraploide typer tåler lidt dybere såning end de småfrøede plænetyper. Samtidig er det vigtigt at frøene er sået så dybt, at frøet er dækket af jord, ellers kan den efterfølgende ukrudtsbekæmpelse skade frøet.

Hvis frøet etableres efter en kornafgrøde, er det helt afgørende at minimere og helst helt undgå spild ved høst. Specielt ved etablering efter vintersæd er det vigtigt at undgå spild. Spildkorn er næsten umuligt at bekæmpe i alm. rajgræs. Før såning af frøet er det derfor vigtigt, at der pløjes meget omhyggeligt, så eventuelle spildkerner placeres i bunden af furen. Affuringerne skal udføres meget omhyggeligt. Det er her, vi ser de største problemer med spildkorn. Husk pakning af jorden.

Etableres frøet efter en bredbladet forfrugt, er pløjning ikke helt så afgørende.

UKRUDT

Det er meget vigtigt at eventuelt græsukrudt og spildkorn bekæmpes effektivt allerede fra efteråret. Der er sidste år opnået en tilladelse til mindre anvendelse af Agil 100 EC til anvendelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand. Den maksimale dosering er 0,1 liter Agil pr. ha, tilsat sprede/klæbemiddel. Den lave dosering sker af hensyn til afgrøden. Der er konstateret betydelige afgrødeskader i forsøgene ved højere doseringer. For at sikre en effekt af den lave dosering er det vigtigt at der tilsættes sprede/klæbemiddel, og der behandles på små spildkornsplanter med 1 til 2 blade. Løsningen er en brugbar mulighed, men kan bestemt ikke løse alle problemer. Derfor er omhyggelig pløjning fortsat grundstenen i bekæmpelse af græsukrudt og spildkorn. **DDF**, **Diflanil**, **Legacy**, **Stomp/Activus** og **Boxer** er midler, der kan anvendes i henhold til deres off-label godkendelser, som kan findes i [Middeldatabasen](#). Husk at have vejledningen liggende før brug af midlet. Alle midler har jordvirkning. Småt ukrudt og jordfugt fremmer effekten. DDF/Diflanil/Legacy skal udbringes umiddelbart efter såning, hvor jorden endnu er fugtig, for at sikre effekten på enårig rapgræs.

[Se løsningsforslag.](#)

SYGDOMME

Svampesygdomme er sjældent et problem i alm. rajgræs, udlagt i renbestand om efteråret.

SKADEDYR

Fritfluer kan blive et problem, men der varsles for 3. generation, og bekæmpelse er meget

sjældent nødvendig.

GØDSKNING

For at sikre en passende udvikling af planterne om efteråret bør der tilføres 25 til 30 kg kvælstof i forbindelse med såning.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.