



SVAMPEBEKÆMPELSE I STRANDSVINGEL

STØTTET AF

Frøafgiftsfonden

Merudbyterne for svampebekæmpelse i strandsvingel har været meget svingende.

Strandsvingel kan angribes af bladplet og meldug. Bladplet vurderes som mest tabsvoldende. Bladplet optræder i fugtige år.

BEKÆMPELSESTÆRSKLER

Bekæmpelsestærsklerne er ikke særlig godt belyst, men bekæmpelse anbefales, når nedenstående tærskler overskrides.

Meldug bekæmpes fra begyndende strækning til begyndende skridning (st. 32- 51) ved over 1,0 procent dækning (få læsioner på nedre blade). Tidlige angreb før strækning kan forekomme, men udløser ikke bekæmpelse.

Bladplet bekæmpes fra begyndende strækning til gennemskridning (st. 32-59) ved over 0,5 procent dækning (højst en læsion pr. skud), hvis der er fugtige forhold.


Rust optræder relativt sjældent, men bekæmpes ved mere udbredte angreb.

OPNÅEDE MERUDBYTTER

I figur 1 er bruttomerudbyterne i landsforsøgene med svampebekæmpelse siden 2005 sammenstillet. Forsøgene er sprøjtet ca. midt i maj med 0,25 l Zenit 575 EC + 0,25 l Amistar (

Zenit er ikke længere godkendt) eller med 0,375 l Bell + 0,15 l Comet/0,3 l Comet Pro (2011-2016).

Sættes omkostningerne til svampemidler og udbringning til 340 kr. og frøprisen til 9,0 kr. pr. kg, så er omkostningerne til sprøjtning 38 kg pr. ha. I 38 procent af forsøgene er der opnået rentable merudbytter ved disse omkostninger. Det gennemsnitlige bruttomerudbytte er kun 2 kg pr. ha. Som det fremgår, er der opnået meget varierende merudbytter for bekæmpelse, og i forsøgene med merudbytter har der i mange tilfælde ikke været tale om sikre merudbytter.



Figur 1. Opnåede bruttomerudbytter for svampesprøjtning i strandsvingel, 29 landsforsøg, 2005-2016.

BEKÆMPELSE

I [tabel 1](#) ses løsningsforslag ved svampesprøjtning i strandsvingel. Der er angivet en dosering på 30-40 procent af normaldoseringen. Ved behov er en enkelt behandling oftest tilstrækkelig.

Til meldugbekæmpelse kan anvendes Orius eller Folicur Xpert. Til bekæmpelse af bladplet kan anvendes Bell, Bell+Comet Pro, Viverda eller Amistar/Aproach + Orius/Folicur Xpert omkring begyndende skridning. Vær opmærksom på, at flere af midlerne som angivet har restriktioner i antallet af tilladte behandlinger pr. vækstsæson.

REGLER FOR BRUG AF VISSE TRIAZOLER

Vær opmærksom på reglerne for den maksimalt tilladte mængde, som man må bruge af visse triazolere. Se nærmere i [PlanteNyt nr. 1183](#).

OPFODRING

Kun frøgræshalm behandlet med Amistar/Mirador må opfodres.



Billede 1. Angreb af bladplet i strandsvingel.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.