

VINTERMØDE HAVEFRØ



Table 1. Strategi til bekæmpelse af ukrudt i spinat. (M1)

Spinat	Plantebestand, planter pr. m ²		Ukrudt, pct. dækning af jord		Udb. og mer-udb., kg frø pr. ha	Plantebestand, planter pr. m ²		Ukrudt, pct. dækning af jord		Udb. og mer-udb., kg frø pr. ha
			græs	tokimbladet				græs	tokimbladet	
	14. maj	15. juni	14. maj			13. maj	13. juni	13. maj		
<i>2016. 3 forsøg</i>					<i>2015-2016. 5 forsøg</i>					
1. Ingen efterafgrøde	22,2	16,5	0	0	924	19,1	18,9	0	0	1.320
2. 12 kg alexandrinekløver	24,8	15,5	0	0	35	20,6	18,3	0	0	93
3. 8 kg sennep, gul	24,8	13,8	1	0	67	19,2	16,7	0	0	3
4. 8 kg alm. rajgræs	23,5	15,8	3	1	-227	19	17,1	0	0	-123
5. 8 kg karse	19	12	0	0	-8	16,5	15,5	0	0	-57
6. 25 kg Terra Gold	19,5	13,3	1	1	48	19	16,5	0	0	145
<i>LSD</i>					<i>ns</i>					<i>ns</i>

Det var ikke muligt at bedømme biomasse ved høst af ukrudtet, da forsøget var nedvisnet og ukrudtet derfor meget påvirket. Observationer gjort viser at der var mange melder i alle led på nær led 1 og 2. LL

Vejret ved behandling: Optimalt - Forsøgsarealets tilstand (evt. trykskader): Ok - Afgrødens ensartethed: Meget uens, meget tørkepræget med meget lav afgrøde, hvilket har resulteret i store usikkerhed i høstudbytte. - Spildkorn og andet ukrudt ved høst: Nogle melder ved høst. - Forløb af høst: Ok. LL

Forsøget skal ikke høstes. Efter aftale med Bartholt bliver forsøget ikke høstet, da det er for småt og uens. Der var meget tørt i maj måned, det kan ses både i forsøget og i marken. Bedømmelser og tællinger gøres færdig og registreres. SAB

LIDT KONKLUSION

På den letteste jord pæne merudbytter for efterafgrøder minus karse

På de tunge jorde negative merudbytter sandsynligvis pga dårlig etablering

HERBICIDSKADE

27 maj 2016
2
5 Command efter fremspiring
4 Command efter fremspiring
4 Command efter fremspiring
2
1
4 Command efter fremspiring



