

Sådan vækstregulerer vi frøgræs 2019

Landskonsulent Barthold Feidenhansl

SEGES

29. Januar 2019

SEGES



STØTTET AF
Frøafgiftsfonden



De enkelte midler

- Cycocel er veldokumenteret i svingelarterne
- Cerone mangler forsøgsmæssig dokumentation.
- Terpal har en godkendelse i visse frøarter, men mangelfuld dokumentation.
- Medax Top indeholder ikke trinexacpac
- Medax Max indeholder trinexacpac


Hvad gør vi så i 2019?

- Trinexacpac-ethyl skal indgå i vækstregulering i frøgræs.
- Kraftige afgrøder kan have behov for vækstregulering udover max. dosering.
- Vi skal lære at bruge andre aktivstoffer sammen med Trinexacpac

Faldgruber

- Cycocel skal bruges senest i stadie 25-32, altså tidligt
- Medax Top godkendt i hundegræs, strandsvingel og rødsvingel til stadie 39. Alm. rajgræs til stadie 49
- Medax Max godkendt i frøgræs til stadie 39 + alm. rajgræs til 49

Sammenhæng mellem udbytte og lejesæd ved blomstring i alm. rajgræs



Effekt af lejesæd ved blomstring på frøudbyttet i rødsvingel

