

INSEKTMIDLET LAMDEX GODKENDT TIL MINDRE ANVENDELSE MOD SKADEDYR I MARKFRØ TIL FRØPRODUKTION

STØTTET AF

Frøafgiftsfonden

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion

Insektmidlet Lamdex (396-77) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion

De godkendte doseringer, antal behandlinger i vækstperioden og behandlingstidspunkt fremgår af nedenstående tabel

Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingstidspunkt og sprøjtefrist

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Behandlings- tidspunkt
Markfrø	Thrips, jordlopper, bladlus, kornbladbillens larve, bladrandbiller, engrapgræsgalmyg	0,2 kg/ha I alt max 0,6 kg pr. vækstår	1-3	Maj – Juli
	Hvedemyg, galmyg, tæger, sommerfuglelarver	0,3 kg/ha I alt max 0,6 kg pr. vækstår	1-2	
		0,4 kg/ha		

Fritfluer, agerugler	I alt max 0,6 kg pr. vækstår	1	
----------------------	---	---	--

Der må maksimalt anvendes 0,6 kg/ha i vækståret.

Lamdex er farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende olieræddike i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.

Lamdex må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet for at beskytte organismer i vandmiljøet.

Der må maksimalt anvendes 0,6 kg Lamdex pr ha eller andre produkter indeholdende

Lambda-cyhalothrin på afgrøden inden for samme vækstsæson.

Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på [Middeldatabasen](#).

Kilde: [Miljøstyrelsen](#)