



INSEKTMIDLET LAMDEX GODKENDT TIL MINDRE ANVENDELSE I OLIERÆDDIKE SOM EFTERAFGRØDE I EFTERÅRET

STØTTET AF

Frøafgiftsfonden

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex til mindre anvendelse mod skulpesnudebiller i olieræddike som efterafgrøde om efteråret.

Insektmidlet Lamdex (396-77) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod skulpesnudebiller i olieræddike etableret som efterafgrøde om efteråret.

Midlet må anvendes 2 gange i perioden 1. august til 1. oktober. Der anvendes 0,2 kg/ha pr. behandling. Der må maksimalt anvendes 0,4 kg/ha i perioden.

Midlet må kun anvendes mod skulpesnudebiller.

Lamdex er farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende olieræddike i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.

Lamdex må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet for at beskytte organismer i vandmiljøet.

Der må maksimalt anvendes 0,4 kg Lamdex pr ha eller andre produkter indeholdende

Lambda-cyhalothrin på afgrøden inden for samme vækstsæson.

Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på [Middeldatabasen](#).

Kilde: [Miljøstyrelsen](#)

© 2021 - SEGES Projektsitet