



## INSEKTMIDLET LAMDEX GODKENDT TIL MINDRE ANVENDELSE MOD KLØVERSKUDEBILLER OG KLØVERGNATEREN I RØD- OG HVIDKLØVER TIL FRØPRODUKTION

STØTTET AF

# Frøafgiftsfonden

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex til mindre anvendelse mod kløverskudebiller og kløvergnateren i rød- og hvidkløver til frøproduktion

Insektmidlet Lamdex (396-77) er blevet godkendt til mindre anvendelse mod kløverskudebiller og kløvergnateren i rød- og hvidkløver til frøproduktion

De godkendte doseringer, antal behandlinger i vækstperioden og behandlingstidspunkt fremgår af nedenstående tabel

*Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingstidspunkt og sprøjtefrist*

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Behandlingstidspunkt
Rød- og hvidkløver til frø	Kløverskudebiller og kløvergnateren	0,3kg/ha   <b>alt max 0,6 kg pr. vækstsæson.</b>	1-2	Før kløveren går i blomst.

Der må maksimalt anvendes 0,6 kg/ha i vækståret.

Lamdex er farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt

ikke anvendes i blomstrende olieræddike i biernes flyvetid fra kl. 03 til 21.

Lamdex må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet for at beskytte organismer i vandmiljøet.

Der må maksimalt anvendes 0,6 kg Lamdex pr ha eller andre produkter indeholdende

Lambda-cyhalothrin på afgrøden inden for samme vækstsæson.

Det er meget vigtigt at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på [Middeldatabasen](#).

Kilde: [Miljøstyrelsen](#)