

Planter

Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret

Alm. rajgræs i renbestand skal etableres i august måned. Læs om etablering og se løsningsforslag til ukrudtsbekæmpelse.

Viden om Opdateret 11. august 2020

Alm. rajgræs skal etableres i sidste halvdel af august måned. Sildige sorter og plænetyperne etableres først. Tetraploide typer og tidlige typer kan eventuelt etableres i den første uge af september.

Udsædsmængden afhænger af sort, type og såtid, men ved efterårsudlæg i renbestand skal udsædsmængden øges lidt i forhold til samme sort, etableret i vårbyg om foråret. Frøfirmaet giver gerne de nødvendige oplysninger for den pågældende sort.

Sådybden er 2 til 3 cm. De storfrøede tetraploide typer tåler lidt dybere såning end de småfrøede plænetyper. Samtidig er det vigtigt, at frøene er sæt så dybt, at frøet er dækket af jord. Ellers kan den efterfølgende ukrudtsbekæmpelse skade spiringen.

Hvis frøet etableres efter en kornafgrøde, er det helt afgørende at minimere og helst helt undgå spild fra dækafgrøden ved høst. Specielt ved etablering efter vintersæd er det vigtigt at undgå spild. Spildkorn er næsten umuligt at bekæmpe i alm. rajgræs. Før såning af frøet er det derfor vigtigt, at der pløjes meget omhyggeligt, så eventuelle spildkerner placeres i bunden af furen. Affuringen skal udføres meget omhyggeligt. Det er her, vi ser de største problemer med spildkorn. Husk pakning af jorden. En mulighed er at etablere vårbyg i foragre, hvor der normalt også er størst risiko for at der opstår problemer med græsukrudt.

Etableres frøet efter en bredbladet forfrugt, er pløjning ikke helt så afgørende.

Ukrudt

Det er meget vigtigt, at eventuelt græsukrudt og spildkorn bekæmpes effektivt allerede fra efteråret. **Agil 100 EC** har en godkendelse til mindre anvendelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand. Den maksimale dosering er 0,1 liter Agil pr. ha, tilsat sprede/klæbemiddel. Den lave dosering sker af hensyn til at skåne afgrøden. Der er konstateret betydelige afgrødeskader i forsøgene ved højere doseringer. For at sikre en effekt af den lave dosering er det vigtigt at der tilsættes sprede/klæbemiddel, og at der behandles på små spildkornsplanter med 1 til 2 blade.

Løsningen er en brugbar mulighed, men kan bestemt ikke løse alle problemer. Derfor er omhyggelig pløjning fortsat grundstenen i bekæmpelse af græsukrudt og spildkorn. **DFF, Diflanil 500 SC, Legacy 500 SC, Sempra 500 SC, Stomp CS** og **Boxer** er midler, der kan anvendes i henhold til deres godkendelser til mindre anvendelse, som kan findes i [Middeldatabasen](#).

Husk at tjekke vejledningen før brug af midlet. Alle midler har jordvirkning. Småt ukrudt og jordfugt fremmer effekten. DFF skal udbringes umiddelbart efter såning, hvor jorden endnu er fugtig, for at sikre effekten på enårig rapgræs.

[Se løsningsforslag.](#)

Sygdomme



Svampesygdomme er sjældent et problem i alm. rajgræs, udlagt i renbestand om efteråret.

Skadedyr

Fritfluer kan blive et problem, men der varsles for 3. generation, og bekæmpelse er meget sjældent nødvendig.

Gødskning

Alm. rajgræs bør tilføres 25-30 kg N ved etablering for at sikre en god udvikling af planterne før vinter. Gødskning er specielt vigtigt hvis afgrøden etableres sent i forhold til optimal såtid.

Emneord

[Frøafgrøder](#)[Rajgræsser](#)

Sidst bekræftet/revideret: 11. august 2020

Vil du vide mere?



Barthold Feidenhans'l

Landskonsulent, Frø

SEGES

baf@seges.dk

+45 8740 5425

Støttet af

STØTTET AF

Frøafgiftsfonden

SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk

