



## UKRUDTSMIDLET CLOMATE GODKENDT TIL MINDRE ANVENDELSE I KINESISK KÅL TIL FRØPRODUKTION

STØTTET AF

# Frøafgiftsfonden

Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion i forbindelse med etablering forår eller efterår.

Ukrudtsmidlet **Clomate** (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion.

Midlet anvendes i forbindelse med afgrødens etablering og senest 3 dage efter såning. Clomate har god effekt på burrenerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske

Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3' år på samme areal.

Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på [Middeldatabasen](#).

Kilde: Miljøstyrelsen

