



## MINOR USE GODKENDELSE TIL PIXXARO EC I SPINAT TIL FRØPRODUKTION

STØTTET AF

# Frøafgiftsfonden

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Pixxaro EC (64-87) til mindre anvendelse mod ukrudt i spinat til frøproduktion.

Ukrudtsmidlet **Pixxaro EC** (64-87) (280 g/ Fluoxypur 280 g/l, Halauxifen 12,5 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i spinat til frøproduktion.

Pixxaro EC er godkendt til 1 behandling på spinatens 4-6 bladsstadie BBCH 14-16 med en dosering på 0,125 l/ha eller i en 2-delt split. 1. behandling med en dosering på 0,05 l/ha på spinatens 2-4 bladsstadie BBCH 12-14 og 2. behandling 2-3 uger senere med en dosering på 0,075 l/ha.

Bemærk at der i samme vækstsæson ikke må anvendes andre midler der indeholder fluoxypur på arealet

Vær meget opmærksom på den risikosætning der fremgår af brugsanvisningen. Der er en tæt sammenhæng mellem dosering, risiko for skader, spinatens vækststadie og sorten. Derfor skal man som avler altid rådfører sig med sin frøkonsulent før man behandler et areal.

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på [Middeldatabasen](#).

Kilde: Miljøstyrelsen

