

Alternative efterafgrøder

Der er fundet kålbrok i olieræddike i 2016 og 2017.




Derfor leder vi efter nye alternative efterafgrødearter.

Art	Udsædsmængde, kg pr. ha
Olieræddike	15
62% Rug og 38% Honningurt.	30
Terra Gold TG1	50
Honningurt	10
Solsikke	30
Sandhavre	50
Havre	130
Vårbyg	150
Sommervikke	150
56 % Sandhavre og 44 % honningurt	30
Katost	30
Klinte	20
Slangehoved	30



Slangehoved



Sandhavre



Klinte

Hvad skal du overveje, inden du sår efterafgrøder?

- Kende **lovlige** arter indenfor relevante ordninger.
- Overveje sikkerheden i etablering af forskellige arter (såning før og efter høst).
- Sædskiftesygdomme som kan overføres med efterafgrøder.
- Vær opmærksom på nedpløjningsdato.

Anbefaling fra Landbrugsinfo

Jordtype	Sædskifte	Forslag til valg af art ¹⁾
Sandjord	Uden vinter-raps	Olieræddike + vinterrug, olieræddike + honningurt
	Minimum 4 rapsfrie år	Olieræddike + vinterrug, olieræddike + honningurt
	3 rapsfrie år eller færre	Honningurt + vinterrug, vårbyg + vinterrug
Lerjord	Uden vinter-raps	Gul sennep + vårbyg, olieræddike + vårbyg, olieræddike + honningurt
	Minimum 4 rapsfrie år	Olieræddike + vårbyg, olieræddike + honningurt
	3 rapsfrie år eller færre	Honningurt + vårbyg
	+ roer	Gul sennep + vårbyg, olieræddike + vårbyg

¹⁾Hvis det ikke er MFO-efterafgrødeblandinger kan første art vælges i renbestand.

Det kan efterafgrøder

Forbedre jordens frugtbarhed

Øge kulstofdannelsen

Opsamling af næringsstoffer – herunder kvælstof