



Sædskifter


Er dit sædskifte langtidsholdbart?

Økologisk planteavl uden fokus på rod ukrudt holder ikke mere end 6 år


Tre gode råd

- Dyrk minimum 20 pct. af sædskiftet med grøngødningsafgrøder, der kan afslås (kløvergræs eller lucerne)
- Hav maksimum 50 pct. af sædskiftet med konkurrencesvage kornafgrøder og højst to år i træk
- Vælg afgrøderne, så der opnås god konkurrenceevne overfor ukrudt i marker med høj bestand af ukrudt

Valg af afgrøder ud fra konkurrenceevne og behov for N-gødning



Valg af sædskifter ud fra konkurrenceevne og behov for N-gødning



Tager du de rigtige beslutninger?

"Gør ikke"	Konsekvens af "gør ikke"	► "Gør i stedet"
Bælgsæd i renbestand i marker med rodukrudd.	Sen høst plus lys og næringsstoffer i sidste del af vækstperioden kan resultere i kraftig opformering af rodukrudd.	Vælg marker uden rodukrudd eller udlæg i stedet kløvergræs til slæt og evt. minisommerbrak.
Vintersæd efter lupin eller hestebønne i marker med rodukrudd.	Fristende at udnytte forfrugten, men det øger omkostningerne til at få "ryddet op". Vintersæd efterlader rodukruddet relativt uforstyrret i en lang vækstsæson uden mulighed for bekæmpelse.	Så udlæg sammen med bælgsæden for at holde på næringsstofferne. Den opformering, der er sket i bælgsæden, vil alligevel ikke effektivt kunne bekæmpes efter den sene høst. Forårsbehandlinger med pløjning og såning af konkurrencestærk vintersæd vil hæmme rodukruddet mere.
Vårbyg efter kløvergræs.	Vårbyg til modenhed kan ikke effektivt optage det frigivne kvælstof, og der er stor risiko for N-udvaskning.	Så havre eller vårhvede med efterafgrøde to år i træk. Alternativt kan der sås vintersæd på lerjord i nedbørsfattige egne.
Områder med en dårligt etableret afgrøde der ligger uberørt til høst.	Hvis der kun er en tynd afgrøde i hele eller dele af marken, vil ukrudtet tage over og skabe problemer fremover.	Vær kritisk og beslut dig senest i begyndelsen af juni måned, om det vil være bedre at bekæmpe rodukruddet og skabe grundlaget for en vellykket afgrøde næste år.
Dårligt etablerede udlæg eller efterafgrøder der ligger uberørt i efteråret.	I områder med dårlig ukrudtskonkurrence vil rodukruddet have frit spil.	Vær kritisk. Det er relativt omkostningsfrit at sætte ind her og det behøver ikke at være hele marken.
Vinterhvede på sandjord.	Vinterhvede på sandjord giver ikke et udbytte, der står mål med omkostningerne og samtidig opformeres rodukruddet.	Vintersæd på sandjord skal være rug, triticale eller vinterspelt.
Vintersæd efter kløvergræs på sandjord i Vestdanmark.	Vintersæden optager kun en meget begrænset mængde kvælstof i efteråret og en stor del kan blive udvasket.	Vintersæd bør kun efterfølge kløvergræs på lerjorde. Vintersæden skal kunne høstes så tidligt, at der kan etableres en vellykket efterafgrøde.

Læs mere på www.landbrugsinfo.dk/udfasning

Yderligere information:

Margrethe Askegaard, mga@vfl.dk



VIDENCENTRET FOR LANDBRUG

Økologi

Agro Food Park 15, Skejby • DK 8200 Aarhus N